

الخطاط القطن في مصر وأسبابه

انهى المقال السابق بالكلام على الخطاط القطن المصري. وثاني هنا على أسباب ذلك ونشفته بالوسائل التي يجب ان تتبع في سبيل إصلاحه

أسباب الخطاط مرتبة القطن المصري

تحضر هذه الأسباب أجيالاً في افساد النقاوى ولم نسر أى خطوة في سبيل تحسين الانواع الموجودة الى ما قبل سنتين معدودة والخطاط هو نتيجة اختلاط بذور باخرى أقل منها مرتبة خصوصاً ذلك النوع المعرف « بالهندي » وهو ذو تيلة قصيرة صوفية short وضعيفة جداً ويشير أصحاب معامل الهايج بمصر ان معدل الهايج أخذ في التصانع سنة بعد آخرى ويوزن ذلك الى وجود بذرة الهندى بمعدل (٨ - ١٠)٪ والتلقيح الخلطى Intercrossing الحالى مع الانواع ذات المرتبة المنخفضة هو العامل الاصلى في الاصنام محلال . وقدر بولز كمية هذا التلقيح (٥ - ١٠)٪ من كمية المحصول الناجى تحت تأثير عوامل الحقل . فهذه الهرجن Hybrids الناشئة من هذا التلقيح الخلطى اذا لم تستحصل تلقيح انواعاً اخرى وينشأ عن ذلك ازيد اى دينار عدد الهرجن الغير ندية . ويضاف