

تقويم الازهار

(يناير وفبراير)

الآن تدخل أغلب نباتات الازهار الشتوية في دور التزهير فلتحفظ رونقها واطالة مدة ازهارها تقطف منها الازهار الذابلة ليسمح لغيرها بالظهور وتواли أرضاها بالرى وتسمد وتعزق خفيها . اما اذا كانت متزرعة في اصص (قصاري) فتسمد بمنقوع السبلة مرة كل اسبوع (بنسبة ٤-٣ مقاطف في نصف برميل ماء) بعد تفككك سطح تربتها بالشقرف وفي اوائل يناير تزرع الأراولا (الكريزانتيموم) من الخلفية الجديدة التي تنمو حول النباتات القديمة بأن تفصل كل خلفة على حدة وتزرع في اصيص صغير نمرة ١٠ مملوء بمخلوط مركب من جزء من الطمي مع جزئين من الرمل اليهض الناعم . وتوضع في مكان مستتر أو في صوبة خشبية لوقايتها من الذبول قبل مد جذورها وعودتها ثانية للنمو، وتسمد السنانيز بمنقوع السبلة أو اليودريت مرة كل اسبوع الى أن تبدأ في التزهير واذا اصيئت أوراقها باليرقات فتنقى باليد مرة أو مرتين في اليوم

وتزرع في الصوب الزجاجية المدفأة عقل السكر وتن والملاوكا
والبتسبودن والفايرن والتوكوما كبسنر وتعمل هذه العقل عادة من
أطراف الفروع الغضة

وكذلك تزرع البجونيا والجلوكسينيا أما بالدرنات الجذرية وأما
بالاوراق وفي الحالة الاخيرة توضع الاوراق على الثرى منبسطة بعد شق
اعصابها من أسفل وتشييدها بحصاة فيخرج درنات صغيرة على الاعصاب
كل منها لو فصل وزرع في أصيص صغير على حدة تكون نباتاً منفصلاً.
وبعضهم يزرع الورقة منتصبة بغزو ذنيبه في الثرى بعد قطع نصفها
الاعلى فتتكون الدرنات الجذرية في أسفل الذنب ومنها ينمو النبات

وتروى البجونيا والجلوكسينيا في مبدأ الأمر باعتدال حتى تبدأ في
النمو فتروى بزيارة ولما تقرب من دور التزهير تسمد خفيفاً بمنقوع السبلة
وإيضاً تزرع عقلة الديغمباكيا والكوليوس والبرابوس في اللام
والكلانكور والكلانكتو والجادينا والبلادجونيوم

وفي أواخر يناير وفي فبراير تزرع عقل بعض أشجار الخشب والظلل
وشنجارات الزينة والاسيجه والمتسلقات أما في اصص نمرة ٢٠ أو ٢٥
واما في الأرض على جهة واحد من متوازن لعمل على حساب تبعنة متون
في القصبيين وعلى بعد ٤٠ سنتيمتراً بعضها من بعض الى أن تبلغ ارتفاعاً
 المناسبة فتنتقل الى مكانها المستقيم الا في حالة الاسيجه فتزرع في محلها
الدائم مباشرة في خطاين متباين على بعد ٢٥ سنتيمتراً بين العقلة والآخر
ومثل هذه العقل لا تحتاج لتدفئة صناعية لمساعدتها على النمو وتعمل بطول
٢٥-٣٠ سنتيمتراً تربياً وتغرس بمائة الوضيع بحيث لا يظهر منها فوق

سعادح الأرض أكثر من ذر أو ذرين وما يمكن تكاثره من أشجار
الخشب والظل بهذه السكينة هو التكويم استائز والخور والبروسونيشيا
بايريفرا . والألياجنس هورتنز (البلح الأفوني) والا ديرينا اندا
(المرجان الهندي) والماكلورا أورانشيا كا الصفصاف البلدي وأبو الشعور
والرفيق . والفلفل ذو الورق العريض (شينص تربنتيفوليوس) ومن
شجيرات الزينة والاسيجة بنت القنصل . والبدايا . والكاليفا .
والبوتيون والبيجوسترم والهبر طامس والكاليرودندرون انرسيل والكاليرو
دندرن اكيوليانا والدورانا والجاستشيا البيضاء والزرقاء . والفلانتش
واتيكبولا تا . واللاتانا كلارا

ومن المتسلاقات التامبرجيا جراندفلورا والشبرفايد والسولام
وندلانداء والارجيريابالبيجونيا فناستا والبوجانفليا (ماعدا النوع الاحمر
وكذلك تعامل الآن تراقيد بعض النباتات التي يصعب تكاثرها من
البذور والعقل كالفل المحوز والتكموما سميزياتي والماجنوليا والبوجانفليا
السمراء الطوب ودم النزال

ويزرع ايضا القرنفل اما بالترقيد اواما من عقل طرفيه
وفي فبراير تزرع الاسطحة الخضراء بالبيضا وتجدد دوائر ورسومات
الشيخ والمطيره بازالة النباتات القديمة وعمل عقل منها وزراعتها من جديد
كل ١٠-٥ عقل معا في بئرة واحدة وكذلك تفضص جذور الداليا
والكندا وتزرع في محلها الدائم مباشرة
ويمعن رى الورد من اواخر يناير لا واخر فبراير وب مجرد انتهائه
من التزهير يقطم ويسمد

وثرع الآن عقل ورد النسر وهو نوع ردىء سريع التفعيمها

فيما بعد بالأنواع الطيبة

وفي هذا الأُوان تعلم الاشجار وتسعدوا كذلك يمكن نقلها او زراعتها

بنجاح ويجوز في أواخر فبراير زراعة عروة بدريه من الازهار الصيفية

وسينتهي الكلام عليها مفصلاً في المدد القادم

ابراهيم كامل

استاذ فلاحة البستانين . بمدرسة الزراعة المتوسطة بمشتهر