

حلقة الخضر

(يناير وفبراير)

المليون - كشك الماز : يبدأ بشتل النباتات الناجحة من البذرة (التي

زرعت في مارس الماضي) على خطوط تبعد عن بعضها من ١ - ٢٠١ مترا

أما في النباتات القديمة التي قرطت في ديسمبر السابق فتحرث أرضها

(مع مراعاة عدم اتلاف النباتات) وتسمى بالسماد البلدى القديم (مقطف

فوق كل نبات) ثم تفتح الخطوط وتسريح بحيث يعمل الترتيب لتفصيلية

النباتات بطبيعة من التراب فوق السماد سمكها ٢٠ - ٢٥ سنتيمترا

ثم تروي الأرض غزيراً - ويبدأ بنمو النباتات في فبراير ولا يغبن

عن الذهن ملاحظة ترقيع الجور الغائبة ووضع علامات بجوارها حتى

لا يجني منها شيئاً في عامها الأول . وتنتج الكيلو من البذرة الجيدة نحو

٤٠٠ شتلات ، ويحتاج الفدان من ٤٠٠٠ - ٤٥٠٠٠ نبات . وكل ما روعي

باتسميد المليون وتفصيله بالتراب جيداً كلما أمكن الحصول منه على

نباتات جيدة يضاء فضية

وقد تزرع الفاصوليا واللوبيا والبصل مع المليون ل الحصول مؤقت

في العام الأول

الكرفس والكرات أبوشوشة : — تبذر البذور في حياض طولها

نحو ١٥ متراً معزوفة ومسمدة جيداً بالسماد البلدي ويمكن شتل النباتات الناتجة ابتداء من يوليه ويراعي في الكرفس عدم نقل النباتات المزهرة في أحواضها وأحسن أنواع الكرفس البلدي والفرنساوي . ويلزم الفدان نحو كيلو من البذرة الجيدة . ويشتغل الكرفس البلدي على جانبي الخطا على بعد ٢٥ - ٣٠ سنتيمتراً . وأما الفرنساوي فعلى جانب واحد على بعد ٥٠ سنتيمتراً

أما الفدان من الكرات فيحتاج نحو ٣ كيلو من البذرة الجيدة أي نحو ١١ ألف نبات ويزرع على جانب الخط على بعد ٢٠ سنتيمتراً تقريباً .

السبانخ — لزراعة النوع البلدي الآن فإنه يقوم بالزهر مباشرة

ولذلك يجتنب زراعته ويمكن زراعة الفيروفلي Virofay وللبطاطس — يجب التكثير بزراعة البطاطس خوفاً من تأثير المحصول بحرارة الصيف وإذا كانت الدرنات كبيرة فيحسن شقها . وأما إذا كانت غير ذلك فيجب زراعتها كما هي ويفضل تفريز الدرنات في مكان هوائي طلق . ظليل رطب حتى يخرج البراعم (العيون) فإذا ماتبلغ طولها نحو سنتيمتراً يجب زراعتها خوفاً من تكسر البراعم

البصل : يبدأ بزراعة (البندق) الشستلة التي زرعت بذورها في أوائل أخريف ابتداء من شهر يناير في المديريات الجنوبيه . وأما الشهاليه فابتداء من شهر فبراير وتشتغل على جانب الخطوط على بعد ١٥ سنتيمتراً تقريباً ويمكن زراعة البصلات بعد تقويرها من الأعلى . وذلك للحصول

منها على بذرة.

الخص : يمكن نقل شتلة النوع البلدى وغيره فى أوائل ينایر لتعطى مخصوصاً متأخراً أملاكاً توجاً والروبين فيمكن زراعة بذرة ملائى الأحواض مع مراعاة خفتها كلما احتاج الأمر ذلك . ولا نقل النباتات اذا زرعت البذرة في هذا الاوان .

الفجل الروى : تزرع البذرة على دفعات حتى يؤخذ منها محصول مستدر ويمكن نقل الرعوس على خطوط لاحصوول على بذرة منها الافت . لا يزرع النوع البلدى الآن لأن النباتات تقوم بزهرها ولكن يمكن زراعة الانواع البيضاء قبل فبراير ومنها لفت أبيض ميلان

Turuip Shogoio Turnip White Milan

الفاصولياء . يبدأ بزراعتها في مصر الوسطى بعد اليوم العشرين من شهر ينایر ويحسن زراعتها من جانب واحد على الريشة القبلية لخطوط التي تبعد عن بعضها بنحو ٦٠ سنتيمتراً . وقد يفرس بعض المزارعين بصلة على الريشة الأخرى كمحصول مؤقت - وأحسن أصناف الفاصولياء التي تزرع لاحصوول منها على قرون خضراء هي البرزها والبلدى اللوبيا . يبدأ بزراعتها في او اخر شهر فبراير وهذه العروة من اللوبيا البلدى تأتي محصول أوفى من التي تزرع في يوليو واغسطس لأن الأخيرة تكون عرضة للإصابة بمرض الصدأ . وقد وجد نوع من ذى النقطة السوداء يعرف بال Rust Immune Lubia يزرع في قسم البساتين بالجذيزه وهو لا يصاب بالصدأ

الملوخية . تزرع الملوخية في الجهات الجنوبية ابتداء من شهر ينایر

وتفطلي أحواضها بالجريدة لتدفتها . وتعلم نباتات هذه العروة بجذورها
أما العروات الأخرى المتأخرة فتشتت ويكون الحصول على

حشات مع مراعاة التسميد والري

الطماطم . تشتت النباتات الناتجة من البذرة التي زرعت في الخريف

على الريشة القبلية لتكون عرضة لحرارة الشمس - وتقلل الخطوط
بالسجاد البلدي وتردم وعند بدء الطماطم بالتلزيم تفتح الخطوط بحيث تصير

النباتات على الريشة البحرية ثم تروي الأرض بعد ذلك

اللفلف والبازنجان : تقرط النباتات (المتروكة لتعقيرها وهي من الانواع

عاده) في يناير ثم فبراير تستمد لمعظمها مخصوصاً لها فمارس ونها هذه العروه

هي المعروفة بالعمر وتتابع بثمن مرتفع ولو أنها صغيرة الحجم وذلك
لظهورها مبكرة في السوق وتنقل شتلة العروه العروس في شهر فبراير

ونك الشتله ناتجه من البذرة المنزرعه بالاحواض في الخريف ومحصول
هذه العروه يعرف بالعروس

ويكون زراعة البذرة في فبراير في احواض 1×5 مترا مسماة

جيد المحصول منها على نباتات يمكن زراعتها بعد ذلك في الصيف

الباوميا : تزرع ابتداء من شهر فبراير وقد تزرع قبل ذلك في المدierيات

الجنوبيه أما في الجهات الجنوبيه فتزرع بعد فبراير ويفضل الاوريون

الصنف الرومي في الشراء عن البلدي ولو أن الأخير أحسن مذاقا

القلفاس . يبدأ بزراعة المحصول البدرى في أواخر فبراير ويستمر

في الزراعة حتى شهر مايو في باطن الخط ويزرع على المصاطب محصول

كالبصل والفاصوليا والخيار واللوبيا الخ ثم بعد نمو نباتات القلفاس تلف

الخطوط حتى تصبح النباتات في وسط المصاطب لتكون كورمات جيدة
والقلقايس نبات يحتاج لـ الكثرة التسميد والرى حتى يأتي محصول وافر وهو
من النباتات المغذية ويمكن تخزينه في أرضه حتى الاحتياج اليه
الكرنب والقرنبيط. يمكن شتلة نباتات ا نوع الكرنب البطء

للحصول منها على محصول في زمن الصيف أما الكرنب البلدى فتنتخب
الرؤوس الجيدة وتقطع وتنقل الجذور للحصول منها على بذره
اما القرنبيط فيراعى خف الا زهار المتروكة للمبذرة من نباتات منتخبة
ويلاحظ رش ازهارها هى وأزهار الكرنب المتروكة للمبذرة اذا صيغت
بالماء محلول الكتنا كيلا ولكن اذا اعني بها وقطفت قممها فلا تؤثر فيها
اصابة المن كثيراً اذ أن قطف القمم يساعد على نضج القرون مبكرا قبل
أن تقوى الحشره على الفتك بها

ابو رکبه . يمكن زرع البذر ثم خف النباتات - ويمكن الشتلة
اذا وجدت النباتات الصغيرة - وبواسطة التجارب التي عملت في قسم
البساتين فقد أمكن الحصول على بذرة من ابي رکبه بمصر ولكن لم
يتحقق حتى الآن ثبات صفاتها

الفصيلة القرعية . يمكن البدء بزراعة نباتات الفصيلة القرعية

(البطيخ . الخيار . القرع . الشمام العجور الخ) ابتداء من شهر فبراير ويحسن
تنمية البذر بنقعها في الماء لمدة ١٢ ساعه ثم تنشل وتوضع في قطعة من
الخيش أو القماش وتوضع في كوم سماد أو قش أو برسيم حتى اذا ما ظهر
نبتها تكون الارض مجهرة فترى ويلزم تسميد الأرض جيداً خصوصاً
اذا وجد سماد زبل الحمام ولا يغيب عن الذهن رش النباتات في باكورة

الصباح يسحوق الكبريت منعاً لمرض البياض وذلك على ثلاثة أدوار
اثناء نمو النباتات في طورها الأول ويوضع المسحوق في قطعة من الشاش
ويضرب عليها فينفذ منها إلى النباتات

محمد عبد الرحيم

بقسم البدائل بالجيزه