

حلقة الفاكهة

الغرس — تنقل أشجار المواتح العارية الجذور و كذلك يمكن نقل المنجو بصلالية من الطين الى محالها الدائم والقشطة اذا لم تكون نقلت في الشهر السابق ويحسن ان تكون بصلالية خصوصاً في الارض الضعيفة. كذلك يمكن نقل فسائل الموز ويلزم الاحتراس في ذلك فلا تقطع الجذور خوفاً من اصابتها بالامراض الفطرية . ويمكن نقل الجواف الى محالها الدائم في شهر مارس اما في قصادي او بصلالية من الطين . وتغرس فسائل التخييل في شهر ابريل اذا لم تكون غرست في مارس . ولغرس النخل ميعادان مارس وابريل وهو المتبوع في الوجه المجري واغسطس وسبتمبر وهو المتبوع في الوجه القبلي ويجب ان تؤخذ الفسائل القوية من الانواع الجديدة فتكون نسبة النجاح فيها كبيرة . وتفصل الفسائل بالآلة حادة ويجب الاعتناء في ذلك حتى لا تجرح خوفاً من تعفنها بعد الغرس ويجب كذلك ازالة الاوراق السفلية ولن الفسيلة بقطعة من الخيش او الحصير عند اشتداد الحرارة والاتهاب بالري المنتظم فلما يكون الرى على فترات طويلة فتهلك من العطش ولا يكون كثيراً فتتغصن خصوصاً اذا وصل الماء الى داخلها ويستمر تلفيغ التخييل لشهر ابريل

التكاثر بالبذرة : تزرع بذرة النارنج والليمون البلدي والقشطة والطرابلس والجوافة والباباظ والتفاح والمكثري في هذين الشهرين وتزرع اما في حياض مخدومة جيداً او في صناديق من الخشب ويتوقف نجاح البذرة على انتظام ريها التكاثر بالعقلة : تزرع عقلة التين والرمان والتربنج والليمون الحلو في شهر مارس وتزرع عقلة الترج في شهر ابريل على خطوط تبعد عن بعضها ٧٠ س.م . وبعد النباتات ٥٠ س.م .

التكاثر بالخلفة : يتکاثر الزيتون بالسرطانات التي تفصل بجزء من الاصل تقسم في روته من الطين وتزرع على خطوط على بعد ٧٠ س.م . وبعد النباتات ٥٠ س.م . وتزرع سرطانات التفاح في اوائل شهر مارس

التطعيم : شهر مارس وابريل هما اهم شهور السنة التي تكثر فيه انواع اشجار الفاكهة بالتطعيم فنطعم انواع الزيتون على الزيتون البلدي بالعين والموالح على اصول النارنج او الترنج او الليمون البلدي ويتماد التطعيم على الطرابلس اذا لم يكن نجح طعم السكاكى أو اللوطس الذى طعم عليه في الخريف. كذلك تطعم المانجو بالعين في شهر ابريل ويجب اختيار الافرع الناضجة لتوخذ منها الميون والاصول السليمة القوية النمو تقليم العنب : قطوش الافرع الجديدة التي تنساق في النمو كذلك قطوش الافرع المشمرة في الشجيرات الكبيرة لأن ذلك يقوى الافرع ويسهل العناقيد ويذكر حجم المثار

التسميد : — تسمد النباتات الصغيرة التي يمشتل من العام الماضي بازوتات الصودا وكذلك النباتات الصغيرة المنزرعة بمحملها المستديم وتسمد الشتلات الصغيرة مثل شتلات النارنج والليمون والمانجو والطرابلس بازوتات الصودا اذا شوهدت مصفحة اللون ضعيفة ولا تسمد الاشجار السكاكية بازوتات الصودا الا اذا لوحظت عليها علامات الضعف.

الري : — تزهر أغلب اشجار الفاكهة في شهر ابريل لهذا لا تروى الا بعد عقد المثار خوفاً من سقوط الزهر مع ملاحظة دئ جميع الاشجار التي تنمو قبل التزهير وتروى الاشجار المشمرة مرة كل ١٥ يوماً الخدمة : — تعزق المشاتل والبساتين عرقاً جيداً لا مستعمال الحشائش منها اذ أنها تنشط وتكثر في هذين الشهرين .

الآفات : — يجب الامتناع عن تبغير الموالح في شهر مارس اثناء تزهيرها وترش اشجار التفاح والكمثرى والبسملة بمحلول بوردو اذا تجمدت اوراقها وجفت حافتها ويكرر الرش كل ٣ اسابيع مرة . وقبداً حشرة المن في الظهور في شهر ابريل وتصيب الشمس والخوخ والتفاح والكمثرى والومان فترش بالكافاكلا او بالغاز والصابون بنسبة ١٪

وترش المنجو والعنب والتفاح والكمثرى وغيرها بمحلول بوردو لوقايتها من الامراض الفطرية والحيشات . راجي يواقيم