

لیقومِ حفتہں

شهر نوفمبر أول السنة الزراعية وفيه يرب المزارع دورة الأرض
ويحدد الإيجار ويستعد لمواجهة عام جديد
الزراعة (الموسم الشتوي) :

يزرع القمح والشعير والفول والبرسيم والكتان والبطاطس وفي الوجه القبلي يزيد على هذا العدس والجلبان والثوم والترمس والقرطم والمحص والختشاش والخلبة والبسلة ومحصولات أخرى.

أما القمح فأوانه المدرى يكون النصف الأول من شهر نوفمبر ويزرع بطريقة الحراثي أو العفير . ولا فرق بين الطريقتين في الأراضي الجيدة وتفضل الأولى في الأراضي التي يوجد بها بعض الأملاح . وفي أراضي الحيطان تكون الزراعة بطريقة اللوق والحراثي .

ويسعد القمبح باحد الاسندة الآتية : جوال من نترات الصودا ،
أو جوال من نترات الجير . أو جوال من كبريتات النوشاذر قبل الزرع
أو بعده .

ويراعي أن تزاري واحده اذا سمدت الارض بالسمدة الازوتيه .
اما الشعير فيصبح أن يتأخر ميعاد زرعه عن القمح .

الفول :

وتعزى زراعته بذرية لغاية ١٠ نوفمبر ومتوقفة لغاية ٢٥ منه وبعد ذلك تتبعه تغيرات متأخرة.

وزراعته تكون عفيراً أو حراتي (تحضير) في الوجه البحري وتزرع باللوقي في حيفهان الوجه القبلي وفي الوجه البحري يستحسن العفريز بعد القطن . وكذلك اذا امكن ان تزرع على خطوط او متون . وهذه الطريقة وان كانت تتطلب عملاً وكلفة أكثر الا أنها تزيد المحصول

وتقلل التقاوى الى أربع كيلات . وكذلك تسمح بعزر الفول ان وجدت حشائش في زراعته .

وبزراعة الفول بعد الأرز يمكن الاستفادة من الاراضي المصالحة بدرجة أرض المتوفية

هذا وزراعة الفول بعد الارز تأتى بمحصول يزيد عن زراعته بعد القطن بمقدار ١ — ٣ أرادب .

هذا وتكون زراعته بعد الارز اليابانى فقط ولا تتأخر عن ٢٥ نوفمبر . وقد يزرع الفول مع القصب كمحصول ثان ويفضل عن زراعة البرسيم معه . أما اصابة الفول بالهالوك — أكبر أعدائه — وعلاجهما فيقترح أن تعزز الارض المزمع زراعتها بالماء يبقى عليها نحو أسبوع

ويسمى الفول بسماد فوق الفوسفات بمقدار ١٠٠ — ٢٠٠ كيلو جرام توضع قبل الزرع أو بعده وفي الاراضي الفقيرة لا يأس من تسميده من ٥ — ١٠٠ كيلو جرام بسماد نترات الصودا أو نترات الجير .

البرسيم :

يزرع منه المتأخر الآن ومنه ما يختص للماشية الموجودة في الزراعة ويزرع عادة فدان لكل رأس .

ويسمى بسماد فوق الفوسفات بمقدار ١٠٠ — ٢٠٠ كيلو توضع قبل الزراعة أو بعدها على البرسيم القصير أو بعد الحشة ويروى بعدها بالماء وفائدة التسميد تكون أظهر في الاراضي الثقيلة أو على البرسيم المتأخر الذي تمنع برودة الجو نموه وكذلك يسمى بمقدار ٣٠٠ — ١٠٠ كيلو من الجبس خصوصا الارض الطينية القلوية نوعا .

الحمصاد :

تحصد الذرة الشامية النيلية والفول السوداني والسمسم وحب الدنبية السلطانية والسبعيني ويحش السمار المزروع في يوليه وقصب السكر ويرسل للمعاصر .

أعمال زراعية :

تحضير أرض القطن في الدواير الواسعة . والعملية تكون عادة في الأرض التي تكون مزرعة أذرة وبرسما تحريشا . ولا يصح أن تأخذ أكثر من قطعة واحدة منه منعا للتأخر في الخدمة .

وتطهر المصارف في هذه الفترة ويترتب على هذه العملية نتائج حسنة

الماشية :

يقتدى في علفها بالرسم حوالى آخر نوفمبر . ويحب أن يكون الانتقال إلى العلف الأخضر تدريجيا دفعا لما ينشأ عن علفها مرة واحدة من أصابتها ببعض الأمراض كالأسفال والنفاخ . ويحسن أن تعطى نصف علية حافة من أول الأمر .

النحل :

تم في الشهر الماضي قطف الخلايا لاخذ العسل والشمع منها وخلال هذين الشهرين (نوفمبر - ديسمبر) يقل خروج النحل من الخلايا لأجل التغذية لابقاء برودة الجو وقلة الازهار في هذا الوقت كذلك ويحسن دائما ترك بعض أقراص من الشمع بدون قطفها حتى يتغذى عليها النحل أثناء الشتاء .

والخلايا الفقيرة بالعسل التي لا ترك بها عسل كاف لتغذية النحل يجب تغذيتها صناعيا بمحلو السكر أو الشمع ذات العسل .

تقسيم السنة

نوفمبر

زراعة بنور الخوخ والمشمش واللوز - يوقف رى الحلويات - تجهيز الأرض لغرس البستين الجديدة - يستمر جمع ثمار المواطن الناضجة واللوز ويشهى جمع الرمان والسفرجل والكاكى واللوتس والقطشب والزيتون فلاحة م - ١١

والبلح العمري والزغول والسمانى والكمثرى والتين ويستمر جمع العنب (الوخرى) — وتنتهى أزهار البشمرة وتأخذ ثمارها في العقد

ديسمبر

ترعرع بذور الخوخ واللوذ والمشمش والجوز — ويع肯 البدهء في نقل أشجار الخوخ والمشمش واللوذ ملشا بعد منتصف الشهير — وقایة نباتات المنجو والبذور المزرعة بالشاتل من برد الشتاء وصقيعها وتجمع ثمار الموالح والياباظ والزيتون الأسود وينتهى محصول التين في أواخره.

نوفمبر

ترعرع بذور الطاطم والبازنجان والفلفل لشتتها في الربيع ويستمر في زراعة بذور البنجر والبسلة والفول الرومى والسبانخ والخبيزة والجرجير والمقدونس والفجل والجزر والسلق ويشتغل الحسن والكرنب الصيفي والبصل والشيكوريا والهندبة والفنوكبا والطاطم
وتفظهر بوادر الخرشوف في آخر الشهر

ديسمبر

ترعرع بذور الجزر والبسلة القصيرة (والسريعة النضج) والفجل والجزر واللفت والسلق والجرجير والسبانخ والخبيزة ويشتغل الحسن والكرنب وبوركه.
وبصل الهندبة والشيكوريا والطاطم
وتفظهر بوادر الشليك

نحو حكم الأزهار

نو فمبر

الاستمرار في تقطيع الورد وتقشه . وتسليمي الورد وتقليمه وزراعة الحوليات الشتوية وزراعة الابصال الشتوية وتكافر الجارونيا والطي علم والمنديه من العقل وزراعة درنات السيكلامن — وزراعة بذور الجاذرن — وقرط سيقان الاراوله التي انتبهي تزهيرها وزراعة الابصال والدرنات الشتوية المتأخرة — وتقليل دى مسطحات الابيا والتجليل

دو سمبر

الاستمرار في نقل الورد وتسليمي النباتات المستديمة منه وتقليم الجاف الاكثار من رى الابصال الشتوية وزراعة أبصال الجلاديوس — مواليات رى الجاذرن .