

## زراعة المخروع في مصر

يزرع المخروع في جميع أراضي القطر المصري ما عدا الأراضي الطينية الثقيلة ويحود بنوع خاص في الأراضي الصفراء الخفيفة والرملية اذا ما سمدت بكميات كبيرة من السماد البلدى

**محضير الأرض** — تحرث الأرض وتزحف في النصف الأول من شهر سبتمبر ثم تترك نحو من عشرة أيام ثم تروى . وتحرث وتزحف مرة ثانية في أوائل شهر اكتوبر ثم تقسم الأرض بعد ذلك بعمل اقنية اتساعها ٧٥ سنتيمترا يكون امتدادها من الشرق الى الغرب ويكون البعد بين كل مروى والتي تليها مترين . وتعمل مساوى أخرى أكبر من الأولى باتساع مترا كل منها على ابعاد ثلاثة مترا متقدمة عموديا مع السابقة لكي توصل المياه من الترع العمومية الى الحقل  
بعد ذلك تعمل الجور كل مترين جورة على الجانب البحري من الأقبية المتدة من الشرق الى الغرب

**مواعيده الزراعية** — يزرع المخروع عادة طول شهراً اكتوبر ويمكن التكثير بزراعته في النصف الأخير من سبتمبر ويمكن اجراءها أيضاً في النصف الأول من نوفمبر  
**كمية التقاوى** — يكفي للفدان الواحد من التقاوى اثنين كيلو جرام من البذور يزرع منها أولاً ١٥ كيلو جرام ويستعمل نصف الكيلو الباقى للترقيع . ويكفى للجورة الواحدة عند الزرع من ٣ الى ٤ حبات ثم تغطى الجور بعد وضع الحبوب فيها بالتراب بطبقة لا يزيد سمكها عن اثنين أو ثلاثة سنتيمترات ثم تروى . ويمكن الحصول على التقاوى من قسم تربية النباتات بالجيرة

**العمليات الزراعية** — يروى الخروع صرة في كل خمسة عشر يوماً ويعزق على الأقل مرة في الشهر وعند ما يبلغ طول النباتات ٣٠ سنتيمتراً يجب خفتها إلى نبات واحد في كل جورة ويراعى أن يكون النبات الذي سيق هو أصح ما في الجوز ويستحسن عند زراعة الحقل أن يزرع معه في الوقت واحد نحو من ٥٠ قصرية (نمرة ١٠) لكل فدان لكي تؤخذ نباتاتها فيما بعد لعملية الترقيع التي يضطر الإنسان لعملها في معظم الأوقات نظراً لموت بعض النباتات ولشذوذ البعض الآخر عن النوع المتراعم فإذا لم يتيسر وجود القصارى فيمكن زراعة الجوز الخالية بحبوب مباشرة .

**الفسمير** — يسمى الخروع عادة بالسباخ البلدى بمعدل ١٠ إلى ٢٠ متراً مكعباً للفردان الواحد حسب طبيعة الأرض ويستحسن أن يعطى السباخ على دفتين المرة الأولى بعد الخف مباشرة والثانية عند التزهير عند ما تبدي النباتات في التزهير يجب تقطيع ظهورها وهي صغيرة لتشجيع النبات على التفرع وتكرر هذه العملية مرتين في خلال مدة أسبوعين ثم يترك النبات وشأنه

**النضج** — يبتدئ المثار في النضج في أواخر مايو إلى آخر يونيو ويضم الحصول مرة في كل أسبوع أو أكثر حسب سرعة أو قلة النضج . ويجب أن تنشر العناقيد بعد جمعها في الشمس لتتجف ثم تفصل الحبوب من الغلاف بطرق مختلفة إلا أن تلك الطرق غير وافية بالمراد وقد اخترعت ما كينة بقسم تربية النباتات لهذا الغرض لفصل الحبوب من الغلاف بدون تتحاشى تكسير الحبوب بقدر الامكان

**التقليم** — في بناء الثالى لسنة الزرع يجب تقليم الأشجار بقطع أطراف فروع العام الماضي بعقص تقليم لتشجيع نمو الفروع التي ستتحمل الثمر في المستقبل

العمليات الزراعية في السنوات المقبلة — تتبع نفس العمليات من رى وعزق  
كما في السنة الأولى غير أنه يجب زيادة مقدار السبانخ تبعاً لزيادة حاجة النبات في هذه  
المرحلة إلى كمية كبيرة من الأسمدة

غفران الفراغ — تتكاثر الأشجار في الأرض عادة من ثلاثة إلى خمس سنوات  
حسب جودة المحصول وينتاج الفدان من نصف طن إلى طن ونصف أو أكثر في  
السنة حسب خصوبة التربة والاعتناء بالعمليات الزراعية

السوق — إن سوق بزور الخروع في مصر كاسدة ومع ذلك فإنه يمكن تصديرها  
للخارج إذا كانت كمياتها كبيرة وأما إذا استخرج الزيت محلياً فأن سوقه تروج رواجاً  
كبيراً ويمكن معاشرة شركة بلاتنر عمارات سانت ماركس رقم ٦ بالاسكندرية

BLATNER & Co. N. 6, St.-Marks' Buildings, Alexandria.

والشركة مستعدة لشراء كل ما يمكن انتاجه بالقطر المصري.

محمد عبد العزيز القسمرى

اختصاصي ثان بقسم تربية النباتات