

Dept. of Animal Production,
Fac. Vet. Med. Baath University, Syria.

EFFECT OF LASALOCID ON BIRTH WEIGHT AND MILK PRODUCTION IN SHAMI GOAT (With 6 Tables)

By
KHALIL OSMAN
(Received at 26/3/2005)

تأثير اللاسالوسيد على أوزان المواليد وانتاج الحليب عند الماعز الشامي

خليل عثمان

SUMMARY

An experiment was carried out to study the effect of Lasalocid on neonatal & milk production in Shami goats. Thirty pregnant female goats were divided into 3 groups each of 10 goats. First group was given 20 mg Lasalocid per head per day. Second group was given 40 mg Lasalocid per head per day. Third group was a control group. The effect on milk production was studied after one month of parturition. Another thirty goats were also divided into 3 groups each of 10 goats. Group one and two received 20 & 40 mg Lasalocid respectively and group one was used as a control. The results demonstrated that the addition of Lasalocid in the goats ration improved the live body weight (L.B.W.) of the neonatals at 21 & 42 days. The increase in L.B.W. was 176.7 & 246.6 g for group 1 & 2 respectively. At 21 days of age the increase in L.B.W was 516 & 748 g for the animals of group 1 & 2 respectively. At 42 days of age the improvement reached 1416.5 & 1395.8 g for group 1 & 2 respectively compared to control animals. Daily milk production was also increased when Lasalocid was given to milk goats for 220 & 200 for the group 1 & 2 after one week of parturition and it was 230 & 220 g for groups 1 & 2 after 2 wks. It was concluded that Lasalocid could be used in a small doses to improve not only the L.B.W of the neonatals goats but milk production as well.

الملخص العربي

تَكُونُ الْبَحْثُ مِنْ جَزَائِينِ الْأَوَّلُ بِهَدْفِ دِرَاسَةِ تَأْثِيرِ الْمَرْكَبِ عَلَى أَوْزَانِ الْمَوَالِيدِ وَالْجَزْءِ الثَّانِي كَانَ لِدِرَاسَةِ تَأْثِيرِ الْمَرْكَبِ عَلَى إِنْتَاجِ الْحَلِيبِ. الْجَزْءُ الْأَوَّلُ يَتَضَمَّنُ دِرَاسَةً تَأْثِيرِ الْمَرْكَبِ

على أوزان المواليد: أجريت على ثلاثة أوزان رأس من إناث الماعز الشامي الحاملة قسمت إلى ثلاثة مجموعات في كل مجموعة عشرة رؤوس. المجموعة الأولى: أعطيت ٢٠ ملغم لاسالوسيد يومياً للرأس الواحد. المجموعة الثانية: أعطيت ٤ ملغم لاسالوسيد يومياً للرأس الواحد. المجموعة الثالثة: شاهد. الجزء الثاني ويتضمن دراسة تأثير المركب على إنتاج الحليب: بعد شهر تقريباً من الولادة أخذت ثلاثة أنثى جديدة وذلك بعد إجراء حلبة تجريبية وقسمت إلى ثلاثة مجموعات كل مجموعة مكونة من عشرة رؤوس. المجموعة الأولى أعطيت ٢٠ ملغم لاسالوميد للرأس الواحد يومياً. المجموعة الثانية أعطيت ٤ ملغم لاسالوسيد للرأس الواحد يومياً. المجموعة الثالثة: شاهد. كان للمركب تأثير إيجابي معنوي على أوزان المواليد، وبعمر ٢١ يوم، و٤٢ يوم، وبلغ متوسط الزيادة في أوزان المواليد للمجموعة الأولى ١٧٦,٧ غ للمجموعة الثانية ٢٤٦,٦ وبعمر ٢١ يوم بلغت الزيادة في متوسط الوزن ٦٥١٦ غ للأولى و٧٤٨ غ في الثانية أما بعمر ٤٢ يوم فكان متوسط الزيادة ١٤١٦,٥ غ في المجموعة الأولى و١٣٩٥,٨٣ في المجموعة الثانية مقارنة مع الشاهد وكان للمركب تأثير إيجابي أيضاً على إنتاج الحليب حيث بلغ متوسط الزيادة في إنتاج الحليب اليومي ٢٢٠ غ للمجموعة الأولى و ٢٠٠ غ للمجموعة الثانية وذلك في الأسبوع الأول بعد بداية التجربة. وكانت الزيادة بعد أسبوعين من بداية التجربة في متوسط إنتاج الحليب اليومي ٢٣٠ غ للأولى و ٢٢٠ غ للمجموعة الثانية وذلك مقارنة مع مجموعة الشاهد وبهذا يمكن القول أن الجرعات البسيطة من ال拉斯الوسيد تزيد في أوزان المواليد وكذلك في إنتاج الحليب اليومي أيضاً.

المقدمة

يعتبر ال拉斯الوسيد والمونازين المركبين الأهم والذان يمثلان مجموعة المضادات الحيوية الأيونية، وال拉斯الوسيد مضاد حيوي أيوني كربوكسيلي وقد استخدم بشكل هام كمضاد للكوكسیدا ورفع مستوى الحالة الصحية للحيوانات Quigley,*et al.*, (1997) وكحاث للنمو من أجل رفع مستوى الزيادة اليومية عند المجترات حيث وجد كل من :

Huston, *et al.*, (1990) Cevdet... (1997) Whittle, *et al.*, (2000) & Yang – (2003)

أن له تأثير إيجابي على الزيادة اليومية عند الجديان والخراف في حين أن الباحثين Erasmus 1999–Webb, *et al.*, (2001) – Strauch, *et al.*, (2003) وجدوا أن له تأثير جيد على مستوى النمو وتحسين درجة السمنة عند الأبقار إضافة إلى زيادة مؤشرات النمو في مصل الأبقار، وأن له تأثير على زيادة الأحماض الدهنية المنتجة وكذلك زيادة البربيونات، ويكمّن تأثيره كمنشط للنمو نتيجة لتأثيره على ميكروفلورا الكرش وعمليات الاستقلاب حيث وجد Quigley, *et al.*, (1992) – Prentice, *et al.*, (2000) أنه يؤثر على زيادة درجة الحموضة في الكرش وكذلك على زيادة نسبة البربيونات المنتجة من قبل ميكروفلورا الكرش في حين وجد Amaro 2002 أن له تأثير على زيادة الأحماض الدهنية وكذلك زيادة البربيونات والمعلوم أن البربيونات تتحول إلى غلوكوجين الذي بدوره يتحول إلى غلوكوز مما يزيد من الطاقة التي يحصل عليها الحيوان، ووجد Erasmus, *et al.*, (1999) أن له تأثير إيجابي على إنتاج الحليب عند الأبقار وكذلك زيادة كمية الدسم واللاكتوز المنتج إضافة إلى تحسين درجة السمنة عند الأبقار.

ويهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير اللاسالوسيد على المؤشرات الإنتاجية عند الماعز الشامي من حيث أوزان المواليد وإنتج الحليب.

المواد وطرائق العمل

أجري البحث في الفترة بين ٢٠٠٣/١١/١ و٢٠٠٤/٥/١ وذلك في محطة تربية الماعز الشامي في حمص.

تمت التجربة على مرتلتين:
المرحلة الأولى:

تم اختيار ثلاثة أنثى حاملة من الماعز الشامي تتراوح أعمارها بين عامين وخمسة أعوام وتم توزيعها إلى ثلاثة مجموعات في كل مجموعة عشرة رؤوس مجموعة أولى ومجموعة ثانية ومجموعة شاهد.

المجموعة الأولى تم تقديم ٢٠ ملخ للرأس الواحد يومياً من اللاسالوسيد.
المجموعة الثانية تم تقديم ٤٠ ملخ للرأس الواحد يومياً من اللاسالوسيد.

ُقدم اللاسالوسيد قبل الولادة بـ ٤٠ - ٥٠ يوم واستمر تقديم ١٥ يوماً بعد الولادة ثم تم التوقف عن تقديم اللاسالوسيد وزننت المواليد بعد الولادة مباشرة وبعمر ٢١ يوم و٤٢ يوم وقد استخدم في عملية الوزن ميزان رقمي دقيق.

وتم تعديل الأوزان بناءً على نوع الولادة وجنس المولود وعمر الأم.
المرحلة الثانية:

أخذت ثلاثة أنثى أخرى من الماعز الشامي بعد شهر من ولادتها وأجريت عليهما حلبة تجريبية لمعرفة إنتاجها من الحليب وذلك قبل البدء باعطاء اللاسالوسيد وبعد معرفة إنتاجها من الحليب تم تقسيمهم إلى ثلاثة مجموعات: مجموعة أولى ومجموعة ثانية ومجموعة شاهد.

المجموعة الأولى تم تقديم ٢٠ ملخ لاسالوسيد للرأس الواحد يومياً والمجموعة الثانية ٤٠ ملخ لاسالوسيد للرأس الواحد يومياً وذلك لمدة ٢١ يوماً وبعد أسبوع من بداية إعطاء اللاسالوسيد تمت حلبة حيوانات المجموعات الثلاثة بشكل يومي ووزن الحليب الناتج حتى نهاية التجربة.

تم خلط مادة اللاسالوسيد الموجودة في الأفانيك Avatec (٩,٠%) مع كمية مناسبة من متروش الشعير ٢١,٥ كغ شعير لكل واحد كغ من آفانيك.
قامت الكمية المخصصة لكل حيوان على حدة بواسطة مكيال في الوجبة الصباحية وكان يتم التأكد من تناول كل حيوان لوجبة المخصصة علماً أنه كان لكل أنثى مربط خاص بها.
 تكونت الخلطة العلفية من:

٥٥,٨% شعير أسود و ١٨% نخالة قمح و ١٤% كسبة قطن مششور و ١٠% نفل عنب جاف
بالإضافة إلى ٥,٥% ملح طعام و ١% كلس.

النتائج والمناقشة

يعتبر الماعز الشامي من سلالات الحليب ويحتل موقع هام من الناحية الاقتصادية ولم تتم دراسة تأثير اللاسالوسيد على إنتاجه ومواليد و قد توصلنا إلى النتائج التالية:

الدراسة الإحصائية:

تم تحليل النتائج إحصائياً باستخدام طريقة الفرق الوحد (AOV). وكذلك باستخدام اختبار بيرسون مربع كاي.

وباستخدام طريقة الفرق الوحد (AOV) Analysis one way of variance لمقارنات الفروقات المعنوية بين مجموعات الدراسة الجداول (١ و ٢ و ٣).

كانت هناك فروق معنوية كبيرة بين أوزان الميلاد الشاهد والتجربة الأولى عند الإناث $P=0.0001$ وكذلك بين أوزان الميلاد الشاهد والتجربة الثانية عند الإناث $P = 0.0002$ وكانت هناك فروق معنوية متوسطة بين أوزان الميلاد التجربة الأولى والثانية عند الإناث $P = 0.0126$ إلى خيفية بين أوزان الميلاد الشاهد الذكور والتجربة الأولى عند الإناث $P = 0.0423$ بينما كانت الفروق المعنوية واضحة بين أوزان الميلاد الشاهد الذكور والتجربة الثانية الذكور $P=0.0000$. وبقيت الفروق المعنوية متوسطة بين مجموعتي الميلاد الأولى الذكور والتجربة الثانية ذكور $P = 0.0245$.

ولم تكن هناك فروق بين مجموعتي التجربة الأولى الإناث والشاهد بوزن ٢١ يوم $P = 0.1150$ بينما كانت هذه الفروق واضحة بين ذكور التجربة الأولى بوزن ٢١ يوم والشاهد وزن ٢١ يوم $P = 0.0000$.

كما لم تكن هناك اختلافات معنوية بين مجموعتي التجربة الأولى والثانية عند الإناث $P > 0.05$ بوزن ٤٢ يوم وبين مجموعتي التجربة الأولى والثانية ذكور بوزن ٤٢ يوم > 0.05 رغم وجود فروق معنوية واضحة بين ذكور التجربة الأولى والشاهد بوزن ٤٢ يوم $P = 0.0000$ وكذلك بين مجموعتي التجربة الثانية والشاهد عند الإناث بوزن ٤٢ يوم $P = 0.0000$.

وباستخدام اختبار بيرسون مربع كاي (Pearson's Chi Square (pearson 2)؛ لمقارنة معدلات متوسط الأوزان العامة وإنتاج الحليب الجداول (٤) و(٥)). نجد أن الفرق معنوي كبير بين مجموعتي الشاهد والمجموعة الأولى $P=0.0052$ ، وبشكل كبير جداً بين أوزان المواليد من المجموعة الثانية والشاهد $P=0.2767$ أما بينما لم يكون هناك فروق معنوية بين مجموعتي التجربة الشاهد بالنسبة لوزن المواليد بعمر ٢١ يوم فكان معنواً بشكل واضح بين مجموعة الشاهد والمجموعة الأولى $P=0.0000$ وكذلك كان الأمر بالنسبة للمجموعة الثانية ومجموعة الشاهد أما بين المجموعتين الأولى والثانية فكان الفرق معنوي بشكل متوسط $P=0.0093$ وبعمر ٤٢ كان الفرق المعنوي بين مجموعة الشاهد والأولى بشكل واضح $P=0.000$ وكذلك الأمر بين المجموعة الثانية ومجموعة الشاهد $P=0.000$ أما الفرق بين المجموعة الأولى والثانية فكان غير معنوي وبالنسبة لإنتاج الحليب قبل بداية التجربة كان الفرق بين المجموعة الأولى والشاهد معنوي بشكل بسيط $P=0.335$ وبين المجموعة الثانية والشاهد كان الفرق المعنوي بشكل بسيط $P=0.0442$ وبين مجموعات التجربة لم يكن هناك فرق معنوي وبالنسبة لإنتاج الحليب في الأسبوع الأول بعد بداية التجربة كان الفرق معنوي بشكل كبير بين مجموعتي الشاهد والمجموعة الأولى $P=0.0002$ وبين مجموعتي الشاهد والمجموعة الثانية كان الفرق معنوي بشكل كبير $P=0.0007$ ولم توجد فروق معنوية بين مجموعتي التجربة وكذلك الأمر بالنسبة لإنتاج الحليب في الأسبوع الثاني بعد بداية التجربة كانت

الفرق معنوية بين مجموعة التجربة الأولى والشاهد $P = 0.0023$ وبين الثانية والشاهد $P = 0.003$.

أما بين مجموعتي التجربة فلا توجد فرق معنوية $P = 0.9147$.

أوزان المواليد:

لقد كان هناك زيادة في أوزان الميلاد بين مجموعة الشاهد ومجموعتي التجربة حيث كان متوسط الفرق 176.7 غ في المجموعة الأولى و 246.6 غ من المجموعة الثانية وهذا يتوافق مع ما وجده

Thomas, et al, (1988) – Thomas, et al, (1990) عند الحمل حيث وجد أن المركب يؤثر بشكل إيجابي على زيادة أوزان المواليد ويعزى ذلك إلى أن اللاسالوسيد يزيد من إنتاج البربيونات والتي ستتحول إلى غليكوجين والذي بدوره يتحول إلى غلوكوز. وكذلك Fluharty, et al, 1991 وجد أن المركب يؤثر إيجاباً بوزن الميلاد عند العجول. وبعمر ٢١ يوم كان متوسط الزيادة في الوزن العام 516 غ للمجموعة الأولى و 748 غ في المجموعة الثانية.

ولقد كان الفرق أوضح بعمر ٤٢ يوم حيث كان متوسط الفرق بين مجموعة الشاهد ومجموعتي التجربة حيث بلغ في المجموعة الأولى 1416.5 غ والثانية 1405.8 غ ويمكن أن يعزى ذلك أن مجموعات التجربة بقيت تأخذ اللاسالوسيد حتى اليوم ١٥ من الولادة والذي يؤثر إيجابياً على إنتاج الحليب وكمية اللاكتوز حسب: Weiss and Amiet (1990) – Fluharty, et al, (1992) - Konwlton, et al, (1996) – Beckett, et al, (1998)

إنتاج الحليب:

لقد كان هناك زيادة في متوسط إنتاج الحليب في مجموعات التجربة حيث كان متوسط الزيادة اليومية في إنتاج الحليب بعد أسبوع من بداية التجربة للمجموعة الأولى 220 غ والثانية 200 غ في حين كان متوسط الزيادة اليومية بعد أسبوعين من بداية التجربة للمجموعة الأولى 230 غ وفي المجموعة الثانية 220 غ وهذا يوافق ما وجده كل من Weiss, et al, (1990) الذي وجد أن اللاسالوسيد يزيد من إنتاج الحليب بمعدل 900 غ يومياً عند الأبقار وكذلك وجد Beckett, et al, (1998) أن المركب يزيد من متوسط إنتاج الحليب اليومي عند الأبقار، في حين أن Knowlton, et al, (1996) وجد أنه إضافة إلى تأثيره الإيجابي على كمية الحليب المنتج يزيد من كمية اللاكتوز في الحليب، أما Fluharty, et al, (1991) فقد وجد أن هناك زيادة في إنتاج البروتين والدهن إضافة إلى زيادة في إنتاج الحليب، في حين أن كل من :

Chistensen, et al, (1994) Erasmus, et al, (1997) – Kennelly, et al, (1998) لم يجدوا أن هناك زيادة واضحة في إنتاج الحليب.

وهكذا نجد أن:

إضافة اللاسالوسيد في النصف الثاني من الحمل بكمية 40 ملغم يومياً للرأس الواحد تزيد من وزن الميلاد والذي سيؤثر إيجاباً على وزن الطعام وصحة المواليد كما أن إضافة مادة اللاسالوسيد بكمية 20 ملغم يومياً للرأس الواحد بعد الولادة حتى نهاية الموسم لأنها أعطت زيادة ملحوظة في كمية الحليب اليومي.

الجدول رقم (١): وزن الميلاد المعدل.

الثانية		الأولى		الشاهد		المجموعة
♀	♂	♀	♂	♀	♂	
٣٩٦٠	٤٣٢٨,٦	٣٨٩٤	٤١٦٩	٣٧١٢,٥	٤٠٣٨,٨	الوسط الحسابي
٤٠,٨٥	٥٧,٢٨	١٦,٧٣	١٦,٥٩	٤٤,٢٥	٤٧,٣٤	الانحراف المعياري
٣٩٠٠	٤٢٦٠	٣٨٨٠	٤١٧٠	٣٦٧٠	٣٩٦٠	المدى
٣٩٩٠	٤٤٠٠	٣٩٢٠	٤٣٣٠	٣٧٦٠	٤١٠٠	

الجدول رقم (٢): وزن ٢١ يوم المعدل.

الثانية		الأولى		الشاهد		المجموعة
♀	♂	♀	♂	♀	♂	
٧٩٢٤	٨٢٩٥,٧	٧٧١٠	٨٠٣٢	٧١٤٢,٥	٧٥١٧,٥	الوسط الحسابي
٦٣,٤٨٢	٤٩,٩٥٢	٣١,١٣٢	٦٩,٠٢٤	٤٥,٧٤	٣٨,٢٣٥	الانحراف المعياري
٧٨٣٠	٨٢٤٠	٧٤٠٠	٧٩٥٠	٧١٠٠	٧٣٦٠	المدى
٨٠٠٠	٨٣٧٠	٧٩٠٠	٨١٥٠	٧١٨٠	٧٦٥٠	

الجدول رقم (٣): وزن ٤٢ يوم المعدل.

الثانية		الأولى		الشاهد		المجموعة
♀	♂	♀	♂	♀	♂	
١١٨٥٠	١٢٣١٤	١١٨٢٠	١٢٣٤٣	٩٧٩٥	١١٢٣٥	الوسط الحسابي
٧٩,٠٥٧	٩٨,٨٠٢	١٩٢,٣٥	١٨٧,٩٨	٤٢,٠٣٢	١١٩,٨٨	الانحراف المعياري
١١٧٥٠	١٢١٥٠	١١٦٠٠	١٢١٠٠	٩٧٥٠	١١٠٧٠	المدى
١١٩٥٠	١٢٤٥٠	١٢١٠٠	١٢٦٠٠	٩٨٥٠	١١٤٠٠	

الجدول رقم (٤): المتوسط العام للأوزان المعدلة / غ.

المدى	الانحراف المعياري	الوسط الحسابي	الشاهد	المجموعات
٤١٠٠-٣٦٧٠	٤٥,٧٩٥	٣٩٣٠	وزن الميلاد	الشاهد
٧٦٥٠-٧١٠٠	٢٠٥,٦١	٧٣٩٢,٥	وزن ٢١ يوم	
١١٤٠٠-٩٧٥٠	١٩٧,١٨	١٠٧٢٥	وزن ٤٢ يوم	
٤٣٣٠-٣٨٨٠	١٦,٦٦	٤١٠٦,٧	وزن الميلاد	المجموعة الأولى (١)
٨١٥٠-٧٤٠٠	١٢٣,١٧	٧٩٠٨,٤٦	وزن ٢١ يوم	
١٢٦٠٠-١١٦٠٠	١٣٨,٢٦	١٢١٤١,٥٣	وزن ٤٢ يوم	
٤٤٠٠-٣٩٠٠	٤٩,٥٥	٤١٧٦,٦	وزن الميلاد	(٢) م
٨٣٧٠-٧٨٣٠	١٣١,٤٥	٨١٤٠,٨٣٣	وزن ٢١ يوم	
١٢٤٥٠-١١٧٥٠	١٤٥,١٦	١٢١٢٠,٨٣	وزن ٤٢ يوم	

الجدول رقم (٥): متوسط وزن الحليب غ/يوم.

المدى	الأحرف المعياري	الوسط الحسابي		المجموعات
٢٤٠٠-١٨٥٠	٢٢٦,٦٣	٢٠٤٥	قبل بداية التجربة بعد أسبوع من التجربة بعد أسبوعين	الشاهد
٢٤٠٠-١٩٠٠	٢١١,٥٥	٢٠٠٠		
٢٣٥٠-١٨٥٠	١٨٦,٧٩	٢٠٤٠		
٢٣٠٠-١٨٠٠	١٦٤,٩٩	١٩٥٠	قبل بداية التجربة بعد أسبوع من التجربة بعد أسبوعين	المجموعة الأولى (١)
٢٥٠٠-٢٠٠٠	١٥٤,٩	٢١٧٠		
٢٤٥٠-٢٠٥٠	١٤٥,٦٨	٢١٨٠		
٢٤٠٠-١٧٠٠	٢٢٤,١٧	١٩٥٥	قبل بداية التجربة بعد أسبوع من التجربة بعد أسبوعين	م (٢)
٢٦٠٠-١٩٠٠	٢١٣,٢٣	٢١٥٥		
٢٦٥٠-١٩٥٠	٢٠٥,٨٢	٢١٧٥		

جدول رقم (٦): التحليل الكيماوي لمواد العلف المستخدمة

المادة	مادة جافة	T.D.N	بروتين %	بروتين مهضوم	الياف خام	دهن خام
شعير أسود	٩٣	٨٥	١١,٩	٨,٨	٥,٨	٢,٥
نخالة قمح	٩٠,٧	٥٣,٨	١٤,٥	١٠,١	١٠,٩	٠,٥
تفل جاف	٩٣	٢٨	١٠,٢	٥,٩٥	٢٣,٢	٨,٤
تبن قمح وشعير	٩٤,٥	٢٩,٩	٣,٢	٠,٦	٣٧,٥	١,٥
كسبة قطن مقشور	٩٤,٩	٧٠	٣٩,٢	٢٦,٩	٧,٨	٨

وتم حساب الاحتياجات الغذائية حسب الجداول العالمية.

المراجع

- Amaro, Fabiano De Rezede, Lucci, Carlos De Souza, (2002): Effects of levels and adaptation periods to sodium lasalocid on the rumen fermentation parameters. R. Bras. Zootec Nov./Dec. vol 31, No 6, 2299-2306 .
- Becktt, S.; Lean, I.; Dy son, R.; Tranter, W. and Wade, L. (1998): Effects of monensin on the reproduction, helth, and milk production of dairy cows. J. Dairy. Sci. 81:1567 .
- Cevdet, A.K. (1997): Effects at lasalocid on weight gain, some rumen parameters and Angora quality in mohar goats. Rep. Ankara. University .

- Christensen, D.E.; Wiedneier, R.D.; Shenton, H.T.; Bowman, B.R. and Olson, K.C. (1994): Effects of graded levels of dietary lasalocid on performance of Holstein cows during early lactation proc. ASAS. 45: 328 .
- Erasmus, L.J.; Smith, I. and Muller, A. (1999): Effects of lasalocid on performance of lactating dairy cows. J. dairy Sci. 82: 1814-1823.
- Erasmus, L.J.; Muller, A.; Smith, I. and Dohagan, (1997): Effect of lasalocid on performance of lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 80 supple: 208.
- Fluharty, F.L.; Mc clure, K.E.; Clevenger, D.D. and Lowe, G.D. (1991): Effects of energy intake and ionophore addition to alfalfa – based. ewe gestation diets. Animl. Sciences Research and Reviews. Special Circular 156.
- Huston, J.E. and Engdahlbs, Calhoun M.C. (1990): Effects of supplemental feed with or without lonophores on lamb and angour kid goats on rangeland. J. Anim. Sci. 68 (12) 3980-6.
- Kennelly, J.J.; Doepel, L. and Lien, K. (1998): Ionophores-model action and effects on milk yield and milk composition. Rep. University of Alerta. Edmonton, AB, Cond. T6G 2P5.
- Konwlton, K.F.; Allen, M.S. and Erickson, P.S. (1996): Lasalocid and particle size of corn grain for dairy cows in early lactation . 1 : Effect on performance, serum metabolites and nutrient digestibility J. Dairy Sci. 79:557.
- Prentice, D.L.; Schaefer, D.M. and Oetzel, G.R. (2000): Effects of lasalocid on the forage to concentrate ratio fed to steers maintained at pre-determined daily average ruminal PH. J. Anim. Sci. vol 78 suppl. 1.
- Quigley, J.D.; Boehms, S.I.; Steen, T.M. and Heitmann, R.N. (1992): Effects of lasalocid on selected ruminal and blood metabolites in young calves J. Dary. Sci. 75(8) 2235-7.
- Quigley, J.D.; Drewry, J.J.; Murray, L.M. and Lvey, S.J. (1997): Effects of lasalocid in milk replacer or calf starter on health and performance of calves challenged with Eimeria species. J. Dairy. Sci 80, 2972-2976.
- Snedecor, G.W. and Cochran, W.G. (1982): Statistical methods. 7th Ed. Iowa Univ.Press,Ames,Iowa USA.

- Strauch, T.A; Neuendorff, D.A; Brown, C.G.; Wade, M.L and Lewis, A.W. (2003): Effects of lasalocid on circulating concentrations of leptin and insulin like growth factor – I and reproductive performance of postpartum Brahman cows. *J. Anim. Sci.* 81: 1367-1340.
- Thomas, V.M.; Mc Lnerney, M.J. and Kott, R.W. (1988): Influence of lasalocid on the production of gestating, late gestation on blood metabolites lamb, birth weight and colostrums composition and production in finn – cross ewes. *J. Anim Sci.* 66, 783.
- Thoms, V.M.; McInerney, M.J.; Ayers, E. and Kott, R. (1990): Influence of lasalocid and supplement level on productivity of gestating ewes grazing winter range. *J. Anim. Sci.* 68:1530 .
- Webb, S.M.; Lewis, A.W.; Neuendorff, D.A. and Randel, R.D. (2001): Effects of dietary rice bran, lasalocid, and sex of calf on postpartum reproduction in Brahman cows. *J. anim. Sci.*, 79, 2968-2974.
- Weiss, W.P. and Amiet, B.A. (1990): Effect of lasalocid on performance of lactating dairy cows. *J. Dairy. Sci.* 73:153 .
- Whittet, K.M.; Encinas, H.B.; Strickland, J.R. and Taylor, J.B. (2000): Effect of ionophore supplementation on selected serum constituents of sheep consuming locoweed. *Amer. Can. Society of Animal Science Vol. 51.*
- Yang, C.M.; Chang, C.T.; Huang, S.C.; Chang, T. (2003): Effect of lasalocid on growth, blood gases, and nutrient utilization in dairy goats fed a high forage, low protein diet. *J. Dairy. Sci.* Dec. 89 (12) 3967-71.

