

## حلقة الأزهار

نباتات الآذن الحوليات الصيفية بالأزهار وهي تحتاج لارى الغزير ويحسن قطف جميع الأزهار قبل تفتحها اذ ان تركها على النباتات وهي صغيرة يسبب أضعاف هذه النباتات ويقصر فصل التزهير . واما يحسن عمله اقتلاع جميع النباتات التي تختلف لون ازهارها اللون المرغوب بقوه حتى لا يحصل تلقيح بواسطة الحشرات من نباتات لآخر تختلف عن بعضها في لون ازهارها وتزرع بنور الحوليات الشتوية في شهر يوليه حادة وتنثر البذور نثرا خفيفا في قصوار او مواجير او صناديق كما اشرنا الى ذلك في العدد السابق . وتعزج البذور الصغيرة بالرمل حتى يمكن توزيعها توزيعا مناسبا أثناء الفتر . وتوضع القصارى او الصناديق في مكان مظلل حتى تثبت البذور ثم تنقل ندريجا الاماكن المعرضة للشمس . ويحسن رى القصارى بعد الابنات في الصباح وقبل الغروب والامتناع عن ريها عند اشتداد الحر اذ ان ذلك يؤثر عليهما تأثيرا سينا . ونفرد النباتات الصغيرة في قصوار نمرة ٥ او نمرة ٨ متى بلغت حجمها مناسبا . ويراعى رى القصارى قبل التفرييد حتى تبقى التريهائين ويبقى جزء من الطين ملتصقا ببذور النباتات الصغيرة وهي ثم التفرييد توضع القصارى الصغيرة داخل الصوبيا في مكان مظلل بضعة أيام قبل تعریضها للشمس

اما الحوليات الودية الجذور كالاشوليزيا وأبي النسوم وأبي خنجر فيحسن زرعها مباشرة في محلاتها المستديمة اذ انها تتأثر كثيرا من النقل وتحتاج نباتات السزاريا الى عناء خاصة فتفرد الشتله حينما تكون مكونة من ثلاثة أوراق ويراعى عند التفرييد ان تؤخذ النباتات بصلة

صغيرة من الطين ملتصقة بالجزور و هنا تظهرفائدة نشربذور السناريا نثرا خفيها عند الزرع اذ يسهلأخذ النباتات بصلابة جول جذورها . و تجري عملية التفرييد بواسطة حشاة صغيرة مدببة وأحسن القصاري لتفرييد السناريا قصاري نمرة ٥ و تuala القصاري بخلوط مكونة من جزء من السبلة المتعفنة جيدا وجذئين من طمي النيل . وهذا الخليط يجب تحضيره بعدة شهور على الاقل قبل التفرييد و تعرية منه للشمس و تقليمه من وقت لآخر

ويراعى عند تفرييد السناريا الى القصاري الصغيرة ان تغرس منافعة بقدر الامكان فانه اذا غطى الثرى والماء قلب النباتات الصغيرة كان سببا في موتها . وبعد التفرييد توضع القصاري في مكان مظلل طلق الهواء . و تروي السناريا قبل التفرييد بكشككة لممارشاش ذي ثقوب صغيرة ولكن متى فردت يجب عدم استعمال الرشاش عند الري بل تروي بالشكشكة مباشرة وأحسن الطرق للري ان توضع قطعة من الخزف فوق سطح الثرى قرب حافة القصارية و يصب عليها الماء باحتراس اذ لو ابتلت الاوراق القربيه من الثرى لا تقصصت به و كطرق اليها الفساد

ومتى نمت النباتات الصغيرة وامتنلات القصاري بجذورها تنقل الى قصاري نمرة ١٥ ثم الى قصاري نمرة ٢٥ اذا اريد تزهيرها في القصاري او تنقل من القصاري نمرة ١٥ الى الارض مباشرة في حياض اما اذا اراد الحصول على نباتات ابدع ما تكون ازهارا فتنتقل هذه النباتات من القصاري نمرة ١٥ الى حياض للتربيه تسمى جيدا بالسبلة المتعفنة وتغرس النباتات على بعد ٦٠ سنتيمترا عن بعضها وعند ما تبدأ في التزهير تنقل الى قصاري نمرة ٣٣ او نمرة ٣٥ باعتماد زائد بصلابة حول جذورها

ومعنى تم النقل توضع القصصardi بمحاذيب بعضها في مكان مظلل تماماً ويجب أن تجري عملية النقل في المساء حتى لا تتأثر النباتات من حرارة الطقس عند النقل . وبعد أن يرجم للنباتات دوننها تفرد القصصardi عن بعضها وقد تصيب نباتات السنوار بابودية القطن التي تلتهم أوراقها التهاباً وأحسن الطرق لابد منها أن تشق باليدي يومياً وهي صغيرة أو زالة الماء بمجرد ظهورها وتحتاج نباتات الأراوا لا اعنابة كبيرة في هذا الوقت فإذا أريدها تغيرها في القصصardi فتقيل إلى القصصardi مرة ٢٥ إن لم يكن قد تم نقلها اللآن بالطريقة التي أشرنا إليها في العدد السابق أما إذا أريدها زرعاً في الحديقة فتعزق الحياض وتستمد بالسلبية المتعففة قبل النقل ويراعى إزالة جميع الأفرع الجافة والضعيفة وتسمد الأفرع القوية التي دعائم من الغاب يجب أن لا يزيد ارتفاعها عن النباتات حتى لا يشوه منظرها . وإذا أصيبت نباتات الأراوا لا بالمن قرش ب محلول الصابون الرخو في الصباح مبكراً أو عند الفروب ويجب إمالة القصصardi على جوانبها حتى لا يسقط المحالول على التربة فتتأثر منه الجذور ولا تحتاج نباتات الورد في شهرى يوليه وأغسطس إلا بموتها بالرى وتنقيتها الحشائش من وقت لآخر وتستمد في آخر يوليه أو في شهر أغسطساً أما بسماد الأرض طبلات المتعفن جيداً أو بنترات الصودا والأخير يساعد على إعطاء زهر كبير الحجم

وتعزق المسطحات المعدة لزراعة جازون جيداً وتسمد حتى تصير معدة للزراعة في شهر أكتوبر أما مسطحات النجيل واللبيا فأنما تكون في كامل نضارتها في ذلك الوقت وتحتاج المري الغزير وتنقيتها الحشائش منها وقت من وقت لآخر وترقع الفراغات حتى لا يشوه منظرها