

نحو يهم الفاكهة

سبتمبر وأكتوبر

النخيل . يمكن استهراز زراعة النخيل خلال شهر سبتمبر وتنتخب لذلك الفسائل المتوسطة الحجم لأن نسبة كبيرة من الفسائل الصغيرة تموت بعد نقلها . والنخيل من أنواع أشجار الفاكهة القليلة التي تنبع زراعتها في مختلف الأراضي . فإنه ينجح في الأراضي الضيئفة أو التي بها نسبة ليست كبيرة من الأملاح الضارة . ويحسن عند نقل فسائل من أرض حلوة إلى أرض صنفية الملوحة أن لا تزرع في مكانها الدائم مباشرة بل تغرس مبدئياً في جزء من هذه الأرض على أن يكون بعد الفسيلة عن الأخرى متراً وتنعمد الرى مدة سنة حتى تعتاد الوسط الذي يقبل في جودته عن الوسط الذي نقلت منه ، ويحسن في الأراضي الرملية الفاكهة بنوع خاص أن ينتخب الزراعة الفسائل الكبيرة ويزداد عمق الجورة التي تغرس فيها الفسيلة كلما كانت هذه كبيرة على شرط أن لا تعمق الحفر لدرجة يكون من الممكن منها تسرب الماء إلى قلب النبات فيتعفن قبل أن يبدأ في النمو . ويجب في الفسائل المنقوله أن تلف قممها النامية لفاح كما بالخليش حتى لا تموت :

تکاثر الموارح . في شهر سبتمبر تهضي بغار الليمون البالدى وعلى ذلك يجب انتخاب المثار الكبيرة التامة النضج ليسهـ خرج منها البذور وزروع ، ويمكن زراعة هذه البذور في شهر سبتمبر أما في مواجر أوفـ

صهاديق هلاً طمى النيل ، هذا اذا كانت كمية البذور صغيرة والافراها
يزرع في حياض ضيقة عرضها نحو النصف متر ، ويزرع في الحوض سطران
على بعد أربعين سنتيمترا من بعضها ، ويتطلب للحياض أرض صفراء
قوية تحرث حرنا عميقا ويفرش عليها طبقة من الرمل الناعم أو طمي
النيل ، وبعد بذر البذور تغطي بطبقة أخرى سمكها نحو السنتيمترتين ثم
تروى . وفائدة الرمل منع تشقق سطح الأرض وهذا يحفظ البذرة من
التعرض لأشعة الشمس التي وصلتها قد تقضي على قوة أنباتها . ويجب
تمهيد هذا الحياض بالرى بحيث لا يصلحها الجفاف أبدا . وبمدانبات البذرة
ية النبت باحطاب القطن أو اوراق التخيل أو المشرائح الخشبية لوقايتها
من برد الشتاء والصقيع

ويُمكن حفظ البذور في الرمل حتى نزرع في شهر مارس
أما شتلات الليمون البلدي والنارنج المزرعة بذرتها في مارس الماضي
فيتمكن نقلها من حياض البذرة إلى المشتل في أول أسبوع من شهر سبتمبر
إذا كانت الشتلات قد بلغت الحجم النب للنقل ، وقبل النقل تشبع حياض
البذرة في الماء الغزير حتى لا تقطع جذور النبات كغير الأبناء العملية ، ونزرع
الشتلة في حياض مستوية خصوصا إذا كانت الأرض عرضة لتهوير الأملاح
على سطحها . وتدرس الشتالة على بعد سنتيمترات سبعين سنتيمترا من بعضها
ويحسن أن تكون مرتبة صفو فامنة ظمة البعد بينها سبعون سنتيمترا وذلك
يسهل الحرف لاستئصال الحشائش . وقد آن للمزارع المصرى أن يستعيض
عن الشغل البدرى باستخدام المواشى والآلات في الأحوال التي يمكن فيها
ذلك لما في ذلك من تقليل للنفقة وكثرة المكتسب ، ويحسن أن يغرس في

كل جورة شقلتان حتى اذا ماتت واحدة بقيت الاخرى فلا يظل مكانها
بودا لايتفق معه في المشغل مدة طويلة

واذا لم تكن الشقلة قد بلغت الحجم المناسب للنقل فيؤجل ذلك الى
ما بعد الشقاء، ويجب في هذه الحالة تسميد الشقلة بفترات الصودا بمعدل
خمسين كيلو جراما للفدان ليزداد نموها.

وأن كانت نباتات النادنج التي نقلت الى المشغل في مارس الماضي قد
بلغت الحجم المناسب للتطعيم فيمكن اجراء ذلك في شهر سبتمبر واكتوبر
فيطعم عليها انواع اليوسفي والبرتقالي ما انواع الليمون فيحسن تطعيمها على
أصول الليمون الماخ وفي هذين الشهرين أيضا يمكن الاستمرار في اجراء
عملية تطعيم المواхى التي لم ينجح طعمها في الشهور السابقة ولكن لا يصح
الآن قطع الاصول كالذرة الجبج طعمها من أعلى التردد المطعوم به بل يجب
رجاء هذه العملية وبعد انقضاء فصل الشتاء

الجوافة . تضيّع ثمار الجوافة في شهر سبتمبر وعلى ذلك تنتخب منها
الانواع الجيدة اللذيدة الطعم الكبيرة الحجم لاستخراج بذرها وتزرع
هذه البذرة في صناديق أو مواجه أو حياض بنفس الطريقة (ان تكلمنا عنها
في زراعة الليمون البلدى التوت . تزرع بذرة التوت في شهر سبتمبر في الأرض بنفس الطريقة
التي شرحناها في زراعة حياض الليمون هذا اذا لم يكن قد تم ذلك في شهر
أبريل الماضي)

الحلويات . يمكن الاستمرار في اجراء عملية التزير (التطعيم بالعين)
للحلويات في شهر سبتمبر ، وقد يمكن تطعيم النوع الواحد من الفاكهة على

أكثر من نوع واحد من الاصول ولكن وجد بالاختيار أن الاصول التي من نوع الطعم تفضل غيرها، ولزيادة الإيضاح نقول أن الخروج مثلاً ينبع من تطعيمه على أصول من الخوخ أو البرقوق أو اللوز أو المشمش أحياناً ولكن شاهدنا أن الخوخ المطعم على أصول من الخوخ البذرة أشجاره أقوى وأحسن وأقل عرضة للأمراض من المطعم على أصول من نوع آخر، وكذلك المشمش يمكن تطعيمه على برقوق أو مشمش ولكن المطعم منه على المشمش البذرة أقوى وأفضل من المطعم على البرقوق، وعملاً بهذه النظرية التي تتفق مع الطبيعة تطعم الأصناف الجيدة من البرقوق على البرقوق الأمريكي أو البلدي، وتطعم أنواع الخوخ الجيدة على الخوخ البذرة والمشمش الجيد الحموي وغيره على المشمش البذرة والسفرجل الرومي على السفرجل البلدي وأنواع الكمثرى الأمريكية على الكمثرى البذرة وأنواع التفاح الجيدة على التفاح البذرة أو التفاح البلدي واللوز الفركش على اللوز ذي القشرة السميكة أما البشسلة فلتصحو به أنبات بذرتها يمكن نثارها بتطعيمها على السفرجل البلدي عند عدم توفر البشسلة البذرة وفي كل هذه العمليات لا يصح قطع الاصول فوق الأزراد المعلومة الناجمة قبل انتهاء فصل الشتاء، وإذا لم يكن وقتها قد نجح تطعيم بعض النباتات بالعين أجري التعليم بالقلم في شهر فبراير.

الري . نظر الانخفاض درجة الحرارة في هذين الشهرين عن الشهور السابقة يمكن إطالة الفترة بين الريتين والآخرى الامر الا في أشجار الكاكى والتين والقططى فالثانية ترى كالمعتاد نظر الاحتياج عاوه الى الماء لتأخذ حجمها الطبيعي، ويروى المزادعون في مديرية الفيوم أشجار الليمون البلدي

والزيتون والحبوب هرّة في الشهر أثناء هذين الشهرين
الآفات . في شهر أكتوبر توش نباتات المنجو الصغيرة يدخل لول
برد و حتى لا تصاب بندوة المنجو