

## حل يقة الفاكهة

التكاثر : تزرع بذرة التوت والبشملة وكذلك بذرة الباباظ والروبس في الصوبة وتوالي بالري المعتدل حتى لا تتفاوت البذور من كثرة الري او قلته وتطعم المانجو بالعين او باللصيق كذلك تطعم اشجار المواجع والزيتون الا انه يستحسن عدم التطعيم في شهر يونيو اذ غالباً ما تكون النتيجة غير هرضية ولكن يجب فك اربطة الطعم الناجحة في شهر يونيو وقوط الافرع التي فوق الطعم كذلك يطعم الكاكى على اصول الطرابلس في شهر مايو وتطعم أنواع البرقوق الجديدة على اصول البرقوق البلدي او الامريكياني

التقليم : تقم افرع العنب التي استرسلت في النمو حتى تقوى الافرع وينخرج عليها افرع جانبية وتخف العنقيد المكتظة بالثار للحصول على عنقيد ذات ثمار كبيرة تنضج دفعة واحدة ولو قالية العنقيد من التلف والامراض بسبب تزاحم الثمار . كذلك تخف الاوراق التكافئة وتزال بعض الافرع الجانبية الجديدة ويجب تعريض الثمار لضوء الشمس حتى يسرع النضج ويحسن ازالة كل الافرع الضعيفة والبلافة لتسهيل عملية التقليم في الشتاء . ويجب ازالة جميع السرطانات والافرع المقيمة (الغير مشمرة) والافرع التشابكة والمتوجه الى قلب الشجرة وتنصف القمم النامية في اشجار التفاح والكمثرى فان ذلك مما يشجع تكون ازداد ثمرية عليها

التاقح : تلتح ازهار القشطة صناعياً في شهر مايو حتى تزيد كمية الثمار على الاشجار اذا المعروف عن ازهار القشطة ان اعضاء الثنائي تنضج قبل اعضاء التذكرة وبذلك لا تلتتح الزهرة ذاتياً الا بواسطه الحشرات والزهور التي لا تزورها حشرة لا تلتح فلذا يجب اتباع طريقة التاقح الصناعي

جمع الثمار : يجمع اللوز الاخضر في منتصف شهر مايو ويبدأ بجمع الخوخ في منتصف شهر يونيو للأنواع البذرية وتجمع ثمار المشمش البلدى والمحوى ويبدأ بجمع البرقوق في الثالث الاخير من مايو للأنواع البذرية اما في شهر يونيو فيجمع البلدى والسكري ويجب جمع الثمار خضراء نوعاً و يتم تكوينها بعد الجماع ويبدأ بجمع

العنب البلدي الاسود والبنائي في منتصف شهر يونيو ويمدأ بجمع الثين في آخر شهر يونيو  
العزيزق : تمزرق الحديقة عزقة جيدة في شهر مايو لتنظيمها من الحشائش التي  
تنمو بشدة في أشهر الصيف ويجب حرق هذه الحشائش لأنها كثيراً ما تكون  
مأوي لكثير من الحشرات

الرى . تحتاج الاشجار الى ما يكثير في هذين الشهرين نظراً لاشتداد الحرارة ولوجود المثار الذى على وشك النضج فبروى العنب مرة فى شهر مايو ومرة فى يونيو أما المشمش والبرقوق والخلوخ فبروى كل ٧ الى ١٠ أيام مرة وتوالى اشجار التفاح والسكندرى بالرى أما المشائق التى بها البدرة والعقل فبروى على فترات قصيرة لأنها تحمل الحر الشديد وبروى التيز مرتين كل أسبوع ويراعى في هذه الاحوال تقلبات الطقس من حيث قلة الحرارة وشدتها التسميد . تسمد المشائق بازوتات الصودا بنسبة ٧٥ كيلو للهكتار ولا يأتى

من قسميد الاشجار الكبيرة الضعيفة بازو نات الصودا او كبريتات الامونيا  
الامراض والآفات : توش اشجار الخوخ والمشمش والرمان المصابة بمحشرة  
 المن بمحارول .كانتا كلا ويكييس الرمان خوفاً من الاصابة بدودة الرمان ويجب  
 قبل التكبير مسح المثار لثلا يكون عليها بعض بقى المحشرة فلا تكون هناك  
 ثمت فائدة من التكبير . اما المثار التي تصاب بذبابة الفاكهة فيجب جمعها واعدامها  
 وترش المثار التي لم تنضج بزرنيخات الرصاص مع السكر . ويظهر حفاظ ساق التفاح  
 والكمثرى فيباد باد خال سلك رفيع في الثقوب او تحقن الثقوب بمحارول ثانى  
 كثي يتور السكر بون وتظهر دودة ورق العنبر في هذين الشهرين فتنقي باليد وتعدم  
 وتصاب عناقيد العنبر وأوراقه بمرض البياض فيبادر برشه بمحارول بوردو بنسبة ١٪ .  
 مرتين بين كل مرة ١٥ يوماً كذلك يصاب العنبر بمحشرة (دودة) صغيرة تنتذى  
 على المثار والبذور وهذه المحشرة خطيرة جداً وقد انتقلت لمصر من الخارج واول  
 ظهورها في مدينة الاسكندرية ويجب مقاومتها مقاومة شديدة برشها عدة مرات بمحارول  
 زرنيخات الرصاص وهي تسمى باللاتينية *Polychrosis viteana* او *Pol. brotrana*

راجی یو اقم