

حلقة الزهور

تُقدِّم البستاني من زراعة الزهور الصيفية بالحياض وهي في أحسن أدوار الأزهار الآن . ومثل هذا البستاني الذي لا يمكنه إراحة حياض الزهور صيفاً أو شتاء يجب عليه العناية بتسميدها جيداً في كل موسم والا ضعفت التربة وساقت النتيجة . والزهور الصيفية كما هي الآن لا تحتاج إلى اكتئاف من الري وإن الزهورها الدابلة وعزيز الحياض لنظافة ما قد تُنَى فيها من الحشائش الغريبة

اما بادرة الزهور الشتوية المبكرة التي قد زرعت منذ شهر يونيو الماضي فانه يجب عليه الاسراع بتفرید ما قد كبر منها إلى القصاري نموه ١٨ و ١٠ ويجب عليه رى قصاري الشتل قبل البدء في عملية التفرید وذلك لكي يتمكن من نقل الشتلات بصليات صغيرة من الطين حتى بذلك لا تتألف الجذور الشعرية الدقيقة التي تقوم بتغذية النباتات كما انه يجب عليه ملاحظة وضع النباتات المشتولة حديثاً في الظل حتى تبدأ بالنمو ثم يشرع بعد ذلك في تعريضها للشمس تدريجياً ولا يزال هناك متسعاً من الوقت للبستاني الذي لم يبدأ بزراعة الزهور الشتوية إلى الآن في ان يشرع في العمل . ويلزم ملاحظة زراعة الجذور في مكان مظلل يتخلله الضوء الوافر . ويجب عليه نثر الجذور وتقطيعها خفيفاً حتى لا تراكم فوق بعضها وتتألف بعد الابنات مباشرة

اما الزهور الشتوية ذات الجذور الوتدية مثل انواع ابو التوم (*Papaver*) وابو خنجور (*Nasturtium*) والاسكلازيا (*Escholtzia*) فهذه يحسن زراعتها بالقصاري وأساساً بمعدل ٣ - ٤ حبات في كل قصرية من ١٨ و ١٠ - اذ ان مثل هذه الانواع لا يمكن تفریدها فيما بعد بسهولة لو زرعت نثراً بالمواجر مثل بقية الانواع . وللتخلص من استعمال عدد وفير من القصاري الصغيرة لزراعة هذه الانواع الوتدية الجذور يستحسن ارجاء زراعتها إلى نهاية شهر سبتمبر او اوائل اكتوبر حيث يمكن نثارها لتثبت بالحياض المعدة لها وأساساً وهنالك بعض من الانواع يستحسن تأخير زراعتها إلى ما بعد تلطاف حرارة

المجوف مثل اصناف «العائق» (*Venidium hirsutum*) والفنديم هرسون تم (*Larkspur*) و *Leptosyne maritima*) وهذه يلاحظ فيها أنها عند ما تزدوج مبكرًا في يوليه أو أغسطس تزهو توًأ وهي صغيرة جداً قبل أن يبلغ حجمها بعضاً من السنتمترات وهذا السبب لا يجب البدء بزراعتها قبل أواخر شهر سبتمبر.

ويجب على البستاني مراعاة العناية التامة في ري البذور سواء كان ذلك قبل الانبات أو في دور الشتل — في الحالة الأولى كثيراً ما نلاحظ ان البذور لا تنبت الا باحدى زوايا القصارى أو المواجه وهذا طبعاً يرجع الى اهمال العامل المكاف بالرالي اذ تجد أنه «يكفي» الواش ويسلطه على الماجور أو القصرية في موضع واحد بدون ان يحرك يده بانتظام في نفس الوقت . وهكذا يزيل غطاء التربة الرقيق وتنكشف البذور : أما في الشتل فكثيراً ما نرى ان الصف الأول غالباً الثاني من طرف الجهة المتعددة الري منها لا تروى بنسبة القصارى التي تلها غالباً ما تموت هذه من التقصير في ريها ، وهذا ينتج على الدوام من ان عامل الرش يوجد جل عذاته الى ري الصنوف الداخلية قبل كل شيء

الاراؤلا: — يجب المبادرة حالاً بنقل نباتات الاراؤلا الى القصارى التمهانية ان لم يكن قد تم ذلك فعلاً قبل الآن . ويلزم على البستاني مداومة ازالة «السمطانات» والافرع الجانبية على السوق الاصلية

السنانيرو: — ستكون المبادرة الاولى من السنانيرو جاهزة الآن للتفريد الى القصارى الصغيرة . ويجب على البستاني ان يعتني بنقل شتلات هذا النوع اذ أنها سريعة النمو وقد تموت حتى من جراء الاهمال البسيط في أثناء هذه العملية ويجب على البستاني ان لا يضم أي نوع من السماد على التربة المعدة للتفريد في أول دفعه . وللتفريد السنانيرو يفضل دائمًا استعمال قطعة من الغاب البلدي تبرى على شكل قلم ترفع بها الشتلة من المواجه الى القصارى الصغيرة . وعند زراعتها يجب عليه ان يراعي عدم دفن «قلب» النبات والا يؤدي ذلك حتماً الى موته . كما انه يجب على الدوام حفظ السنانيرو في بحر هذه المادة يمكن وافر الظل كثیر الضوء

الداهليا: — تكون الذاهليا في احسن أدوار نوها في هذه المادة . وتعطي

الأنواع المفردة منها كثيراً من البذور ويمكن للبساطي جمعها لزراعتها في
الموسم المقبل

حدائق الابصال : — تكون أنواع الابصال الشتوية الآن في دور السكون

اما الابصال الصيفية فانها لم تزل نامية وتحتاج الري المتوسط في هذا الوقت

المسطحات : — تحتاج مسطحات النجيل واللبيا الى كثرة الري في هذا

الوقت واذا كان هناك قطع لم تزل بوراً يجب المبادرة بزراعتها قبل فوات الوقت

اما المسطحات المزمع زراعتها بالجلازون فهذه يجب المداومة بريها وازالة ما قد يكون

نمي عليها من الحشائش الغريبة قبل ان تنضج ثمارها

حدائق الورد : — تكون أغلب أنواع الورد في دور السكون الآن والزهور

التي تنتج من هذه النباتات تكون ضعيفة بطبيعة الحال . ويجب ملاحظة تقليل مياه

الري على قدر المستطاع واذا اراد الحصول على اصول من النسر للتطعيم عليه امستقبلا

فيتمكن عمل العقل وزراعتها في بحر شهر اغسطس وهي تنمو على الدوام بنسبة جيدة

محمد درار

