

حد يقية الزهور

الحوليات : — لا يزال البستاني جاداً في تفريد الزهور الشتوية كما ذكرنا في العدد الماضي وليس عليه الا ان يقرأ التعليمات التي وردت في العدد المذكور والعمل بمقتضاها في مسألة تفريد الشتلة والعناية بها في دورها الاول
أما البستاني الذي لم يبدأ بزراعة أي بادرة من العروة الشتوية الى الآن لسبب ما فعله أن يسرع بالزراعة حالاً والا يعد عمله متأخر
وقد سبق ان تكلمت عن الانواع الوتدية الجذور وكيفية زراعتها بنجاح فلا داعي الآن اتمتكرار ذلك

وهناك أمر قد سبق أن أشرت اليه في الاعداد الماضية من هذه المجلة وهو عدم ارتكان البستاني على الانواع التي اعتمد أن يزرعها كل شتاء بل يجب عليه أن يهتم بالحصول على حوايات جديدة غير التي تكون بمجموعته . وهو لو تكلف بعضاً من التعب في زيارة بعض الحدائق الاخرى لرأى كثيراً من الحوليات الجديدة التي تستحق اهتمامه — وهذه المناسبة أذكر بعضاً من تلك الانواع على سبيل المثال

(١) ديمور فتسكا اكاونس *Dimorphotheca Ecklonis* : — أدخل قسم

البساتين هذا النوع في السنوات الاخيرة من جنوب أفريقيا وهو الموطن الأصلي للنبات . والنوع المذكور مستديم في الحقيقة الا انه يحسن تربته كلزهور الشتوية كل عام لسهولة ذلك . وهو نبات يرتفع من ٥٠ — ٧٠ سنتمترًا وينمو بشكل منتظم ويخرج ازهاراً كبيرة بيضاء اللون مشوبة ببعض الزرقة خصوصاً على جانب البتلات من الخارج . ولقد أرسلت كمية من هذا النوع لبعض تجار البذور على سبيل التبادل ببلاد الانسكايز ويظهر ان هذا النوع قد صادف اقبالاً عظيماً هناك اذ أرسل التاجر المذكور يطلب اكبر كميات ممكنة توريدها — وعلاوة على ذلك فاننا نجد مرسوماً في كشف بذوره وهو صوفاً وصفاً بديعاً — وبالجملة فلقد أصبح هذا النبات موضوع عنايتهم . فلماذا لا ينتشر هذا النوع انتشاراً كافياً بالحدائق المصرية أيضاً . حقاً انه لمن أول واجبات القائمين بأمر تدوير البستانيين أن يفرسوا في نفوسهم العمل على اقتناء الانواع الجديدة وزراعتها مع الحوليات الاخرى .

(٢) وهناك نوع آخر لا يقل أهمية وجمالاً عن النوع السالف غير انه لا يزال نادراً بالحدائق القطر رغم سهولة الحصول على بذوره — وهذا النوع المقصود هو « لبتسين مرتيا » (*Leptosyne maritima*) وهو نبات حولي ذو أوراق ريشية مقسمة لحمية يخرج كثيراً من الازهار الصفراء اللون الكبيرة الحجم . والانواع الجديدة متعددة لا يكفينا الفراغ المعد لحديقة الزهور لو أريد سردها غير انني اكتفي بهذين المثليين عسى يقبل البستانيون على الدأب للحصول على ما يظهر بالحدائق المصرية من الزهور الحولية الجديدة

النباتات المستديمة — لقد لوحظ ان كثيراً من أصحاب البساتين وعلى الخصوص

الصغيرة منها يميلون الى استخدام النباتات المستديمة إما اقتصاداً في النفقات أو عن ميل طبيعي في النفس . وهذه فكرة لا بأس بها في البساتين التي يرغب اصحابها زراعتها على هذا النمط . ولو اعتنى صاحب البستان وبذل بعضاً من وقته في درس هذا الموضوع لا يمكنه أن يجعل حديثه تفيض بالزهور الجميلة الألوان طول وقت

السنة . ولا يخفى ان جو القطر المصري يلائم نمو كثير من النباتات المستديعة طول العام فهناك مثلاً مجموعة كبيرة من النباتات التي تزهر في فصل الخريف والشتاء وهلم جرأ . وليس على صاحب البستان في هذه الحالة الا أن يجمع العدد المناسب من النباتات المستديعة وتقسيمها تقسيماً نسبياً بين الاحواض المعينة بحديقته بحسب موسم أزهارها حتى لا يتخلو الحديقة من الازهار طول فصول السنة . وسأختصر في هذا العدد على ذكر بعضاً من الانواع التي تزهر في الخريف والشتاء فقط وهي كالآتي : -

- (١) ستانس مكرفيلا (*Statice macrophylla*) - يزهر هذا النوع طول وقت السنة الا انه يكون في احسن ادوار الزهر ابان الخريف والشتاء ويمكن زراعة بذوره اما في الخريف أو الربيع . وهو نبات عريض الاوراق يخرج كثيراً من الازهار الزرقاء اللون . ويمكن استعمالها للقطف اذا تمكث ازهاره لمدة طويلة .
- (٢) لفنديولا برتناويدس (*Lavandula abrotanoides*) - تزرع بذور هذا النوع إما في الربيع أو الخريف وهو يتدبىء في الزهر أثناء الفصل الاخير ويستمر الى أواخر الشتاء وأوراق هذا النوع جميلة التقسيم خضراء اللون وتخرج أزهاراً على سيقان طويلة

- (٣) جريبرا جامسوني (*Gerbera Jamesoni*) - يمكن زراعة بذور هذا النوع اما في الربيع أو أواخر الصيف وكذلك يمكن تكاثره بالتقسيم . وهو نبات يخرج أوراقاً عريضة من على وجه الارض ، وأزهاره التي تختلف في الألوان غاية في الجمال . وهو يزهر مرتين في العام وذلك أثناء الخريف والربيع . وكثيراً ما نشاهده يخرج أزهاره في الصيف أو الشتاء الا أن الفصلين السالفين يعدان بمثابة موسم أزهاره
- (٤) سالفيا لوكانثا (*Salvia Leucantha*) يخرج هذا النوع سيقاناً عديدة بجانب بعضها ويحمل أزهاره الزرقاء ذات اللون السماوي بكثرة أثناء فصل الخريف . ويمكن تكاثره بالتقسيم الجذري . ويجب ازالة الافرع القديمة بعد انتهاء الازهار سنوياً لتشجيع خروج غيرها

- (٥) سالفيا سبلندنس (*Salvia splendens*) - يعد هذا النوع من بين أهم النباتات

المستديمة انتشاراً بالحدائق المصرية — وقل أن يوجد نبات آخر يجاربه في موافقته للطقس المصري من بين النباتات المستديمة فهو لا تنقطع أزهاره طول العام وينمو بالاماكن الكشيفة الظل أو المعرضة للشمس على حد سواء ويمكن تكاثره من البذور طول وقت السنة ما عدا فصل الشتاء

لنكتفي بما ذكر الآن واعداً حضرات القراء بتكميل الكشف في الاعداد المقبلة لضيق المقام

الاراولا : — ليس هناك اكثر من الدائمة على تشجيع نمو هذه النباتات بتسميدها بالسماد السائل وملاحظة عدم اصابتها بالمن الاسود ولقد ذكر هذين الامرين بالتفصيل في الاعداد الماضية فلا لزوم لاعادتها تانياً

السنانير : — اذا اتبع البستاني ما جاء في العدد الماضي عن السنانير فليس لديه اكثر من نقلها الى القصري النهائية ، كما انه يجب عليه الاستمرار في حفظها بمكان وافر الظل متوسط الضوء ، ويستحسن نقلها من اوائل سبتمبر الى موضع معرض لشمس الصباح

حديقة الأبال : — يكثر العمل في حديقة الابال منذ اوائل سبتمبر اذ تحتاج معظم الأنواع الشتوية الى الزراعة والري لتبدأ بالنمو . ويجب كذلك جمع بذور لأنواع الصيفية التي اخذت في النضج الآن ويجب على البستاني البدء في زراعة أنواع النرجس والامرلس (*Amargllis*) والفريزيا (*Freesia*) في اوائل سبتمبر المسطحات : — يحسن تخفيف ري مسطحات التجميل واللبيا بخلاف ما كان عليه في الصيف . أما مسطحات الجازون فهذه يجب البدء بتسميدها في اثناء سبتمبر لزراعتها في اوائل اكتوبر

حديقة الورد : — يجب الاكثر من ري حديقة الورد منذ اواخر سبتمبر حيث أن معظم أصناف الورد بالقطر تبدأ في النمو من هذا الوقت . ويمكن اجراء تطعيم الورد في بحر شهر سبتمبر

وكذلك يمكن زراعة عقل النسر في اثناء سبتمبر لتطعيمها في الربيع المقبل

محمد درار