

## حديقة الخصى

الهلليون (كشك الماز): تنقل نباتات الهليون القديمة من حياض البندرة الى محلاتها المستديمة في شهر يناير ويجب التبكير بالشتل في هذا الشهر لأن طبيعة هذا النبات ان يبدأ بنوه في فبراير اما الزراعات القديمة فيكشف التراب عن جذور نباتاتها ثم يوضع فوق كل نبات مقطف من السماد البلدي ثم تغطى فوق ذلك بالتراب الذي يؤتى به من ريشتي الخط بحيث تصبح النباتات في وسط الخط ثم تروى واذا كانت هناك نباتات ميةة اي محلات خالية فيؤتى لها بالشتلة وتملأ المحلات الخالية ثم يوضع عصاً بجوارها بحيث يعرف محلها لئلا يترك بغير جمع للعام المقبل وفي العادة تزرع الفاصوليا على الريشة القبلية والبصل على الريشة البحرية كمحاصيل مؤقتة في السنة الاولى من زراعة الهليون فيجب ملاحظة وضع بذور الفاصوليا بعد الرية الثانية لأن الهليون في ابتداء زرعه يحتاج لريتين متتابعتين وذلك الري المتواتر في اول حياة الفاصوليا يؤثر على محصولها

الفاصوليا: يبدأ بالعروة الاولى بعد اليوم العشرين من شهر يناير وتزرع عادة من الريشة القبلية اما الريشة البحرية فتزرع بالبصل وقد اعتاد بعض المزارعين على زراعة الفاصوليا على ريشتي الخط ولكن وجد بالتجارب ان الفاصوليا اذا خططت ارضها الى خطوط متباعدة عن بعضها ٦٠ سم. ثم زرعت على ريشة واحدة فانها تأتي بمحصول مساو لزرعها على الريشتين وزيادة على ذلك تتوفر كمية التقاوى اللازمة للفدان ويسهل اجراء عملية العزق اذا زرعت الريشتين

اللوحية: تبذر اللوحية في شهر يناير ثم تغطي حياضها بالقش والجريد لتدفئتها وهي اول عروة لها وعادة تقلع نباتاتها بجذورها في هذه العروة بعد نضجها ولكن في الزراعات المتأخرة فلا تصالح النباتات وانما تقرط كلما نمت وصلحت اوراقها للاستعمال وقد يفيد التسميد الورقي فيها برش السماد الكفري بعد زوال الندى عن اوراقها

البصل: يشتل البنق (الزريعة) في شهر يناير على جانبي الخطوط وقبل الزراعة تلوى عروش الزريعة اذا كانت قوبة أو تقطع اذا كانت خفيفة ثم تعمل الى حزم وتوضع في الشمس لمدة أسبوع فيجف الضيف منها ويبقى القوي على حاله وتفقد الاوراق كثيراً من مأها وبذلك تكون الرؤوس أسهل تأصلاً في الارض البطاطس — بعد تحضير الارض من خدمة وتسميد تزرع درنات البطاطس بعد

تقطيعها الى نصفين اذا كانت كبيرة وتستهمل بأكلها اذا كانت صغيرة الحجم ويلاحظ تنبيت البطاطس قبل الزرع حتى تخرج عيونها قليلاً بحيث لا يزيد النبت عن سنتيمتر واحد طولاً واذا زادت عن ذلك تكون عرضة لتصفها أثناء عملية التقسيم أو الزراعة ، ويجب التبكير بميعاد الزراعة في يناير لان تأخيرها يسبب نضجها وبذا يدخل عليها الحور الذي يوقف نمو الدرنات . وعملية التنبيت بسيطة وذلك أن تفرد على الارض في محل ظليل فتجد الهواء ويمكن اسراع عملية التنبيت بتفضية الدرنات بشيء مثل الاكياس أو الخيام .

الكرفس والسكرات - تحضر الحياض لزراعة بذور الكرفس والسكرات ابو شوشة في شهر يناير لانتاج شتلة تنقل في شهر يوليو ويلاحظ ان بعض نباتات الكرفس البلدي والكرات ابو شوشة تزهر وهي حياض البذرة لان وقت تزهر هذين الصنفين في أوائل الربيع فيجب عند الشتل عدم نقل النباتات الزهرة او الضعيفة لأن بزراعتها تستدعي ضياعاً لمجهود عظيم

السبانخ : يمكن زرع بذور السبانخ الافرنكي « الغير وفي » في هذا الاوان من السنة ولكن لا يمكن زراعة السبانخ البلدي في هذا الميعاد لانها تقوم بالزهر مباشرة الخس : يمكن زرع بذور الخس اللاتوجا والرومية في حياض وعدم نقلها بل تحذف كلما دعت الحالة لاستعمال بعضها — اما اذا وجدت شتلة فيمكن نقلها في يناير الى خطوط على جانبي اللان

الطماطم : تشتل الطماطم في شهر يناير والشتلة التي تستعمل في هذا الوقت ناتجة من البذرة المنزوعة في اكتوبر وتشتل عادة النباتات على الريشة القبليية بخلاف الزراعات المتأخرة فانها تشتل على الريشة البحرية والسبب في وضعها بالريشة

القبليية هو لخصوبها على اكثر ما يمكن من حرارة الشمس في هذا الوقت الرطب من السنة — ويلاحظ رفع الغطاء الذي استعمل لتغطية حياض البذرة في شهري نوفمبر وديسمبر قبل الزرع بمدة اسبوع على الاقل حتى تعرض الشتلة للشمس لانه لو ترك الغطاء عليها حتى يوم الزرع ثم شتلت تكون رخوة فتثني وقت الزرع وتموت نباتات كثيرة عند تعرضها فجأة الى الهواء .

الفجل — يمكن زراعة بذوره كلما احتيج اليه

اللفت الابيض — يمكن الحصول عليه بزراعة بذوره في هذا الوقت اما اللفت البلدي فلا يزرع في هذا الوقت لأن نباتاته تزهر في اوائل الربيع وكذا يمكن زراعة البنجر كلما دعي اليه الحال

الباذنجان — تثلل النباتات الصغيرة التي زرعت بذورها في شهر نوفمبر الماضي وتسمى هذه العروة بالعروس وتكون عملية الشتل عادة في فبراير اما النباتات القديمة التي حفظت من العام الماضي للسنة الحالية لتكون عقراً فيجب ان تقلم قليلاً جيداً ثم تسمد وبعد عزقها تروى حتى تقوى النباتات على ان تجدد اثمارها وتكون عادة ثمار هذه النباتات صغيرة وحمرة نوعاً الا انها ذات سعر حسن لظهورها في السوق مبكرة قبل ثمار العروس المشتولة نباتاته في فبراير

ويمكن زراعة بذور الباذنجان في شهر فبراير لانتاج شتلة يمكن نقلها في اوائل الصيف ولا يحفظ عقراً الا البلدي ( اي الاسود الطويل )

الفلفل — ان العمليات التي تجرى في الباذنجان يمكن اجرائها في الفلفل الا ان الفلفل الذي يحفظ عقراً عادة هو البلدي فقط . اما الرومي فلا يحفظ لان المرض من الرومي هو استعمال قرونيه في الحشو فيجب ان تكون ذات حجم كبير منتظم بخلاف التي تنتج من العتر فانها تكون صغيرة مكبية فتفقد ميزتها

الباميا — وهو نوع انخضر المنتشرة زراعته في جميع القطر ويمكن البدء في زراعته في شهر فبراير بعد ري الارض اولاً ثم نقع البذور في الماء وزرعها عند ما تكون الارض قد جفت نوعاً وتقبل عمليات الزراعة من غير ان تكبس بالارجل لوطوبه بها واحسن الاصناف هي البلدي القصيرة فهي مبكرة وذات ايراد وافر

وقد يتوهم بعض المزارعين ان البامية الغير شوكية تفضل الشوكية ولكن ظهر بالاختبار ان البامية الشوكية لها طعم اذ من الانواع الاخرى اللوييا — يمكن البدء بزراعة اللوييا في شهر فبراير وذلك برى الارض أولاً ثم تترك حتى تجف نوعاً — وبعدئذ يؤتى بالبذور وتوضع في الطرى بعد كشف التراب الجلف ثم تغطى بالتراب الرطب

ويستمر في زراعة اللوييا حتى شهر يوليو ولكن افضل زراعة لها هي الزراعات المبكرة اذ المتأخرة يلحق بها الصداً فيهلكها

الكوسة : وهي صنف الكوسة المدادة والكوسة القصيرة أو الاسكندراني الخنصرة والكوسة المدادة صنفان ذات الثمار البيضاء وذات الثمار الخضراء الا ان الصنف الاول عليه الطلب اكثر وذو ثم اغلى من الصنف الثاني . فبعد تحضير الارض وتسميدها وتخطيطها الى الابعاد المناسبة لكل صنف تروى وبعد بضعة ايام عند قرب جفافها تنبت البذرة وذلك بنقعها في الماء لمدة اربعة وعشرين ساعة ثم تلف في قليل من البرسيم الاخضر وتحزم حتى تبدأ في الانبات وبعد ذلك تزرع لوضع ثلاثة بذور في كل جورة وعند تفتيت البذرة في الارض تحف النباتات بترك اثنين في كل جورة اذا كان الصنف من الكوسة القصيرة أو نبات واحد اذا كانت الكوسة مدادة وتعمل الجور متباعدة عن بعضها بمسافة ٥٠ — ٧٠ سم وتعمل المسافات الضيقة في الارض الضعيفة والمسافات الواسعة في الارض القوية . ويجب رش النباتات بمسحوق الكبريت ثلاث مرات على فترات متقطعة حتى تنقي شر مرض البياض الذي يسبب ضعف النباتات بل اهلاكها القلقاس — يبدأ بزراعته في شهر فبراير وذلك بانتخاب الدرناات الصغيرة الفكوك ، وغرسها في باطن الخط وهو محصول رائج ذو طعم لذيد

الخبازي — تزرع العروة الاولى في شهر فبراير . وقد يحتاج الى تدريب بقليل من الحطب في أوائل نموه اتقاء من الرياح الشمالية الباردة البطيخ والشمام : يبدأ بزراعة هذين الصنفين في شهر فبراير في أرض الجزائر وجهات الصحراء والبرلس ويجب ملاحظة تنبيت البذرة قبل زرعها . وانقطع

الآتية جديرة بالاهتمام : (١) يجب انتقاء البذور حتى يكون الصنف ذا نوع واحد وبدا لا يحدث اختلاط يفسد ميزة الصنف المراد تكاثره (٢) يجب رش النباتات بالسكربت رشا متتابعاً حتى تنقي الارض شر مرض البياض (٣) يجب خف ثماره حتى تقوى النباتات على اتمام الثمار بحجم جيد (٤) يجب عند كسر البذرة أن تنتخب الثمار الجيدة السليمة ويعرض عن أخذ البذور من التي بها تحجر في لحمها الكرنب — يمكن شتل نباتات الكرنب البطة في أي وقت حتى يحصل على

كرنب في الصيف في الوقت الذي لا يمكن فيه انتاج كرنب بلدي

أما جذور الكرنب التي لم تنقل لاستخراج بذورها فيجب نقلها مباشرة بمجرد قطع رأسها وكذا يجب انتخاب جذور الكرنب الحائزة للصفات الحسنة من كبر في الحجم وانتظام في الشكل وقد تصاب أزهار الكرنب بالمن في دورين أولها في أوائل فبراير والآخر في أوائل مارس فيمكن ابعاد خطر الدور الاول بالرش بمحلول السكتا كلا أو محلول الصابون والغاز . أما الدور الثاني فيأتي متأخراً في قم الافرع الزهرية فيمكن في هذه الحالة قطف قم الازهار المصابة وحرقتها وفي هذه الحالة يبعد الخطر عنها حتى تكون القرون أخذت حجماً كبيراً فلا تقوى الحشرة على العبث بها وبذا نكون قد قاومناها مقاومة زراعية . وفي القطف فائدة أخرى زيادة على فائدة ابعاد الحشرة وهو تشجيع القرون على النمو فتنتج بذوراً أقوى

القرنبيط — لا يمكن زراعته في هذا الوقت من السنة أما العمليات التي تلزمه في هذا الوقت فهي اللازمة لتربية بذورته وتمحصر في خف ازهار الرأس في حالة صفرها لأن رأس القرنبيط يحمل أزهاراً كثيرة فلو تركت كلها انتجت بذوراً ضعيفة وكذا يجب بعد الخف تسميد النباتات المتروكة للبذرة تسميداً جيداً حتى تقوى على انتاج بذور جيدة لان الغذاء الموجود في الارض قد استهلكه النبات في تكوين الرأس ابو ركبته — اذا أريد الحصول على محصول منه يمكن شتله أو زرع بذورته في أي وقت ويجب تسميد الزرع والاعتناء بربه حتى تكون رؤوسه جيدة طرية ذات طعم لذيذ لأن عدم الاعتناء بزراعته ينتج محصولاً ذا رؤوس بيضية خشنة